



عنوان آموزش اوتیت مدیا



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی
بیمارستان شهدای پاکدشت



بیمارستان شهدای پاکدشت

در صورت فشار دادن یک شی به داخل گوش یا گریه بیش از حد کودک احتمال عفونت گوش وجود دارد که این عفونت ممکن است طی چند روز ادامه یافته و بهبود یابد این عفونت در ساختمان گوش میانی ایجاد شده و از طریق شیپور استاش به قسمت های پایین تر گسترش می یابد و معمولاً به دنبال سرما خوردگی و گلو درد و عفونت های رایج دیگر رخ می دهد تورم ؛ گرفتگی و درد در گوش از جمله علائم همراه در این عفونت می باشد . تجمع موکوس در پشت پرده صماخ باعث اختلال در شنوایی و درد میشود که در صورت پارگی پرده صماخ و خروج مایع بعد از چند روز بهبودی در در را داریم

تظاهرات بالینی

- ۱- درد در گوش
- ۲- تب
- ۳- خروج ترشحات از گوش (در صورت پارگی پرده صماخ)

سایر علائم

گریه بیش از حد و گرفتن گوش توسط کودک (در نوزادان)
تحریک پذیری / اختلال در خواب / اختلال در شنوایی و تعادل

روش درمان

مسکن ها

ایبوپروفن: مصرف دقیق دارو طبق دستور پزشک
از جمله (دوز دارو متناسب با سن تجویز میشود)
عوارض جانبی مهم این دارو
ضعف و بی حالی / استفراغ / درد معده بعد از مصرف

آنتی بیوتیکها

باعث تسریع در بهبودی و از بین رفتن عفونتهای باکتریایی گوش می شوند. در درمان این عفونت آنتی بیوتیکهای خاصی مورد استفاده قرار میگیرد زیرا مصرف بیش از حد آنها باعث مقاومت به آنتی بیوتیکها و عدم کارآرایی آنها در آینده میشود



واحد آموزش به بیمار
و ارتقای سلامت



واحد آموزش به بیمار
و ارتقای سلامت

آدرس: تهران - کیلومتر ۱۸ جاده خاوران
تلفن: ۰۳۶۴۴۲۰۵۵ - فکس: ۰۳۶۴۴۲۰۹۱
وب سایت: shpmc@sbmu.ac.ir

عوارض جانبی آنتی بیوتیک ها

ناراحتی های معده / اسهال / راش

جراحی (معمولاً به صورت خفیف می باشد)

در این روش جراحی تیوب کوچکی به

داخل گوش تعبیه میشود grommets نام

که با ایجاد سوراخ در پرده گوش منجر به

تسهیل خروج ترشحات از گوش می شود

این روش باعث پیشگیری از عفونتهای مکرر

در گوش بخصوص در ۶ ماه اول بعد از عمل

میشود

پیش آگهی

از هر ده کودک ۸ کودک بدون هیچ درمانی طی ۲ تا ۳

روز بهبود می یابند. اما اغلب آنها دچار عفونتهای مکرر

می شوند که در این صورت اختلال در گفتار و زبان و

مشکلاتی در مدرسه رادر پی دارد ولی در روند رشد و

تکامل کودک در طولانی مدت اختلالی رخ نمی دهد

زیرا با افزایش سن احتمال ابتلا به عفونتهای گوش

کاهش می یابد

عفونت گوش نیز ممکن است باعث ناشنوایی کامل و

اختلال در یادگیری شود

در صورت گسترش عفونت به استخوان پشت گوش

تورم - درد و حساسیت در لمس وجود دارد

پیشگیری

۱- پیشگیری از ابتلا به سرما خوردگی در کودکان

۲- عدم قرار گیری در معرض دود سیگار

۳- اجتناب از تماس با سایر کودکان مبتلا به سرما

خوردگی و سایر بیماری های عفونی

۴- تغذیه با شیر مادر (ترشحاتی IgA)

نوعی حفاظت کودک در برابر عفونت ها است

۵- عدم تغذیه با بطری شیر در حالت دراز کشیده

۶- عدم دسترسی کودک به اسباب بازی های آلوده

۷- واکسیناسیون در برابر آنفولانزا در صورت عفونت

های مکرر گوش