



عنوان آموزش دررفتگی مادرزادی مفصل ران



دانشگاه ه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی شهید بهشتی
بیمارستان شهدای پاکدشت



بیمارستان شهدای پاکدشت

بیمارستان تخصصی شهدای پاکدشت به عنوان اولین بیمارستان شهر پاکدشت، تحت الطاف خداوند با هدف تامین و گسترش سلامت مردم منطقه بدون توجه به عوامل نژادی، قومی و جنسیتی و با تکیه بر دانش و فن آوری روز و با بهره گیری از مدیران خلاق و حضور کارکنان کارآمد و دلسوز در زمینه درمان انواع بیماری ها با مهربانی و حفظ احترام بیمار و همراهان در حد توان خدمت می نماید. این مرکز به پذیرایی بیماران از سراسر کشور اقدام می نموده و با رعایت استانداردها مراقبت بالینی، خدمات بهداشتی - درمانی و آموزشی با کیفیت و موثر ارائه می نماید و در این راستا ایمنی، امنیت و رضایت بیماران و کارکنان را مد نظر قرار می دهد

سر استخوان ران جا انداخته شود و از طریق کشش به مدت چند هفته در جای خود نگه داشته شود و بعد از آن به مدت چند ماه از آتل استفاده شود یا پا را گچ می گیرند. در سنین بالاتر و زمانی که کودک راه افتاده است دیگر با این وسایل نمی توان کاری کرد و نیاز به عمل جراحی می باشد. در سنین بالاتر حتی عمل جراحی نیز کارساز نخواهد بود عوارض بیماری دررفتگی مادرزادی مفصل ران اگر کودک در اوایل نوزادی تحت درمان قرار گیرد قاعدتا به طور طبیعی راه خواهد افتاد و دچار عوارضی در آینده نخواهد شد، اما در صورتی که درمان دیر صورت گیرد و یا اصلا درمان نشود خطر لنگیدن دائمی یا آرتريت زودرس در مفصل ران مبتلا وجود خواهد داشت



واحد آموزش به بیمار
و ارتقای سلامت



واحد آموزش به بیمار
و ارتقای سلامت

آدرس: تهران - کیلومتر ۱۸ جاده خاوران
تلفن: ۰۳۶۴۴۲۰۵۵ - فکس: ۳۶۴۴۲۰۹۱
وب سایت: shpmc@sbmu.ac.ir

از هر هزار نوزاد یکی به علت ایجاد ساختمان غیر طبیعی مفصل ران در هنگام تولد دچار عارضه دررفتگی مادرزادی مفصل ران می شود. این عارضه در فاصله کوتاهی از تولد و نیز در معاینات منظم در سال اول تولد قابل تشخیص است

دررفتگی مادرزادی مفصل ران چیست؟

علت بنیادی این عارضه شناخته نشده است در این عارضه سر استخوان ران به جای اینکه داخل حفره لگن قرار داشته باشد در بالای آن واقع است. گاهی علت آن است که محفظه الیافی احاطه کننده مفصل ران ضعیف است یا حفره استخوان لگن به طور غیر طبیعی کم عمق است و همین موجب جا به جایی و ناپایداری یکی از مفصل های ران یا هر دو آن ها می شود. این بیماری می تواند ژنتیکی نیز باشد و همچنین شیوع آن در دختران بیشتر است، احتمال بروز این عارضه در نوزادانی که با پاها متولد می شوند بیشتر است

علائم بیماری دررفتگی مادرزادی مفصل ران علامت بارز دررفتگی مادرزادی مفصل ران محدودیت در انجام حرکات پای مبتلا می باشد. در صورتی که تا زمان راه افتادن کودک این بیماری تشخیص داده نشود ممکن است

متوجه علایم زیر شوید

- لنگیدن

- در پشت پای معیوب چین های

- پوستی بیشتری در زیر باسن نسبت به

پای دیگر وجود دارد

- بعد از سن سه ماهگی اغلب کوتاهی

- غیر طبیعی در پای مبتلا دیده می شود



در صورتی که فرزند خود را برای معاینه نزد پزشک می برید، پزشک پای نوزاد و مفصل ران او را مورد بررسی قرار می دهد و اگر مفصل جا به جایی داشته باشد، زمانی که سر استخوان ران به داخل حفره می رود لغزیدن یا جا افتادن استخوان را احساس می کند برای تشخیص این بیماری برخی بیمارستان ها از سونوگرافی استفاده می کنند درمان بیماری دررفتگی مادر زادی مفصل ران جا به جایی مفصل ران غالباً به فاصله کوتاهی پس از تولد خود به خود اصلاح می شود بهترین زمان درمان این بیماری همان زمان تولد و درمان زود هنگام است. در صورتی که در هفته پس از تولد این عارضه رفع نشود پزشک از آتل برای انداختن سر استخوان ران به داخل حفره و نگه داشتن آن در آنجا استفاده می کند. آتل به مدت ۲ الی ۴ ماه گذاشته می شود و به شما طریقه نگهداری از کودک در این دوران را آموزش می دهند اگر تشخیص این بیماری در حدود ۶ هفتگی یا دیرتر صورت پذیرد ممکن است لازم باشد