



مسمومیت با متادون



بیمارستان شهدای پاکدشت



- آشنایی با علائم مسمومیت با متادون





متادون چیست ؟

متادون نوعی دارو برای ترک اعتیاد است که در اشکال قرص و شربت در بازار موجود است . نوعی آگونیست است با نیمه عمر ۱۵ تا ۴۰ ساعت که د مقایسه با مرفین که ۲ الی ۵ ساعت است نیمه عمر بسیار طولانی تر دارد .

مسمومیت با متادون در کودکان:

مسمومیت با متادون به عنوان داروی ترک اعتیاد رو به افزایش است . ویکی از گروه های سنی در معرض خطر اطفال هستند که اکثرا به دلیل مصرف اشتباه دپار مسمومیت و متی مرگ می شوند . والدین در اکثر موارد شربت متادون را در ظروف مانند بطری آب معدنی یا نوشابه و یا ظروف شربت های دارویی (استامینوفن - دیفن هیدرامین) در یخچال نگه داری می کنند که اشتباهها به کودک داده می شود.

مصرف کنندگان متادون باید بدانند مصرف داروی متادون توسط کودکان بسیار خطرناک و کشنده است و والدین مراقب کودکان خود باشند که فرزندشان فدای سهل انگاری آنها نشوند.

در صورت مصرف متادون توسط کودکان علائم مسمومیت شامل تهوع، استفراغ، درد قفسه سینه و دیگر علائم مسمومیت بعد از مدت کوتاهی ظاهر شده و پس از گذشت چند ساعت با پیشرفت علائم، کودک جان خود را از دست می دهد.

علائم مسمومیت :

تهوع

استفراغ

درد قفسه سینه

اختلال هوشیاری

اختلال تنفس (سپرشن تنفسی)

نبض ضعیف

اختلال گوارش

مردمک ته سنجاقی



توصیه به والدین :

طعم نسبتا مطلوب و شیرین آن باعث مصرف

اشتباه ان توسط کودک میشود لذا:

-از ریختن دارو در شیشه آب معدنی و شیشه شربت به شدت خودداری کنید

-نگهداری دارو دور از دسترس اطفال باشد

-تمویل گرفتن دوز دارو از مراکز ترک اعیاد به میزان

مصرف روزانه