




آنژیوگرافی

قلب



بیمارستان شهدای پاکدشت

- حساسیت به داروی حاجب (ماده رنگی)، امروزه با استفاده از داروهای جدید این عارضه به ندرت دیده می شود.

- خونریزی؛ این عارضه نیز شایع نمی باشد.

- تشکیل لخته در خون که منجر به سکته قلبی و مغزی می شود.

- عفونت؛ این عارضه نیز نادر می باشد

منابع:

۱- پرستاری بیماریهای قلب و عروق، پروتروسودارت، ۱۳۸۸

۲- بیماریهای قلب و عروق، هاریسون، ۲۰۰۵

3-www.web . EbscohosT . com , Grordge match, Backer . cinda , 2003

4- Coronary Angiography. Available from: <http://www.mdconsult.com/das/patient/body/239248648-6/1145776724/10041/32410.html>. Accessed March 2011.

5- Patient Teaching Reference Manual.(2002). Springhouse.

۲۴ ساعت از خم نمودن اندام مورد نظر و رانندگی اجتناب کنید.

در اسرع وقت با دردست داشتن مدارک و معرفی نامه بخش جهت پیگیری درمان به پزشک معالج مراجعه فرمایید.

دوش گرفتن کوتاه مدت در شرایط کم بخار مانعی ندارد.

▪ داروهای خود را طبق دستور قلبی پزشک به مصرف رسانید.

▪ پیاده روی را در برنامه روزانه خود بگنجانید.

▪ از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی اجتناب کنید.

▪ در صورت بروز درد یا کبودی در محل آنژیوگرافی از کیسه آبگرم و یا حوله گرم استفاده نمایید.

▪ در صورت داشتن علائم زیر پزشک یا پرستار را در جریان قرار دهید:

درد قفسه سینه

درد یا بی حسی در پا یا بازو (ناحیه عمل)

سرد شدن ، کبودی و یا آبی رنگ شدن بازو و پا (ناحیه عمل)

تب

عوارض

عوارض عبارتند از:

بی نظمی ضربان قلب که معمولاً گذرا بوده و بدون نیاز به دارو برطرف می شود.

آنژیوگرافی چیست؟

آنژیوگرافی عروق کرونر به معنی عکسبرداری از رگ های خونی قلب با استفاده از تزریق یک ماده رنگی حاجب) می باشد. با این روش پزشک از گرفتگی یا عدم گرفتگی سرخرگ های کرونر قلب آگاهی می یابد.

روش انجام کار:

برای انجام آنژیوگرافی نیازی به بیهوشی نیست گاهی قبل از شروع کار یک آرام بخش به شما داده می شود برای شروع یک ناحیه از بدن شما، معمولاً بازو و یا کشاله ران تمیز شده و با یک بی حس کننده موضعی بی حس می شود. در این ناحیه یک رگ، گرفته می شود و از طریق این رگ لوله ای باریک و توخالی به نام کاتتر توسط پزشک به سرخرگهای قلب هدایت می شود. پزشک نوک کاتتر را از روی مانیتور رادیوگرافی مشاهده کرده و آن را هدایت می کند.

هنگامی که کاتتر در محل مورد نظر قرار گرفت ماده حاجب تزریق می شود و از این جریان فیلم های متعدد گرفته می شود. طول مدت آنژیوگرافی بسته به شرایط مورد بررسی ممکن است تا یک ساعت طول بکشد.

اقدامات قبل از انجام آنژیوگرافی:

در صورت مصرف داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین از سه تا چهار روز قبل مصرف دارو را متوقف کنید.

- جواب آزمایش خون، نوار قلب و عکس سینه را یک روز قبل از آنژیوگرافی به بخش مربوطه تحویل دهید تا برای شما پرونده تشکیل شود.
- گاهی اوقات شب قبل از انجام آنژیوگرافی در بیمارستان بستری می شوید در غیر این صورت معاینه پزشکی در همان روز قبل از شروع کار انجام می پذیرد.
- در صورت حساسیت به غذاهای دریائی مثل میگو و ماهی یا حساسیت به مواد حاجب در گذشته پزشک را در جریان قرار دهید.
- از خوردن و آشامیدن به مدت ۸ ساعت قبل از آنژیوگرافی خودداری کنید.
- یک روز قبل از آنژیوگرافی به حمام بروید و موهای زائد کشاله ران، قفسه سینه و ناحیه زیر بغل را بتراشید.
- اگر باردار هستید پزشک را مطلع سازید.
- زمانی که برای آنژیوگرافی مراجعه می کنید از پوشیدن زیورآلات و دندان مصنوعی خودداری کنید و یک نفر همراه داشته باشید.
- از کاربرد لوازم آرایشی خودداری نمایید.

آنچه را در حین انجام کار حس می کنید:

– شما در حین انجام آنژیوگرافی بیدار هستید و ممکن است در هنگام رگ گرفتن و جاگذاری کاتتر در رگ احساس ناراحتی و درد داشته باشید.
– در هنگام تزریق ماده حاجب به داخل قلب ممکن است احساس گرما کنید گاهی هم ممکن است دچار

افت فشار خون، حالت تهوع و کاهش ضربان قلب شوید، که چون نظارت مستقیم پزشک متخصص می باشید مشکلی ایجاد نمی کند و قابل کنترل خواهد بود.

– ممکن است در دهان خود احساس یک مزه شور یا تلخ داشته باشید و یا دچار گرگرفتگی شوید که به علت تزریق ماده رنگی است.

اقدامات بعد از انجام آنژیوگرافی:

- پس از اتمام کار کاتتر برداشته می شود و در محل آن یک پانسمان فشرده و محکم جهت جلوگیری از خونریزی گذاشته می شود.
- یک کیسه شن در ناحیه عمل جهت جلوگیری از خونریزی قرار داده می شود.
- پس از آنژیوگرافی به مدت ۲۴ ساعت بستری می شوید و از نظر علائم حیاتی و عوارض بعد از آنژیوگرافی تحت نظر قرار می گیرید.
- استفاده از مایعات به مقدار زیاد جهت دفع بهتر ماده رنگی توصیه می شود.
- جهت جلوگیری از خونریزی، برای چندین ساعت باید به پشت بخوابید که این مسئله کمردرد خفیفی را ایجاد می کند.
- تا ۶ ساعت پس از آنژیوگرافی نباید از تخت خارج شوید.
- پس از ترخیص شما می توانید فعالیت خود را به آرامی شروع کرده و به تدریج به حد طبیعی برسانید اما برای