

بنام خدا

بیمارستان شهدای پاکدشت

داروهای شایع
هنگام ترخیص در
بخش های
بیمارستان

لیست داروها :

نام دارو	شماره صفحه
۱-متفورمین	۵
۲-زیپمت	۶
۳-گلورپیا	۷
۴-انسولین نوورپید(آبی)	۸
۵-انسولین لانتوس (طوسی)	۹
۶-انسولین شفاف(رگولار)	۱۰
۷-انسولین شیری(ان پی اچ)	۱۱
۸-آسپرین	۱۲و۱۳
۹-کلوپیدوگرویل	۱۴
۱۰-ریواروکسابان	۱۵
۱۱-انوکسپارین	۱۶و۱۷و۱۸
۱۲-لووفلوکساسین	۱۹
۱۳-سیپروفلوکساسین	۲۰
۱۴-لوزارتان	۲۱
۱۵-فورزماید	۲۲
۱۶-آتوروستاتین	۲۳
۱۷- والپرات سدیم (دپاکین)	۲۴و۲۵
۱۸-گاباپنتین	۲۶
۱۹-سفالکسین	۲۷
۲۰-مترونیدازول	۲۸
۲۱-داکسی سایکلین	۲۹
۲۲-مفنامیک اسید	۳۰
۲۳-آزیترومایسین	۳۱
۲۴-شربت منیزیوم هیدروکساید	۳۲
۲۵-هماتینیک	۳۳
۲۶-فروسولفات	۳۴
۲۷-سفیکسیم	۳۵
۲۸-پنتوپرازول	۳۶

نام دارو	شماره صفحه
۲۹-دیکلوفناک	۳۷
۳۰-کلیندامایسین	۳۸
۳۱-ایبوپروفن	۳۹
۳۲-شربت فارمنتین	۴۰
۳۳-اسپری سالبوتامول	۴۱
۳۴-اسپری بکلو متازون	۴۲
۳۵-اسپری نازال کلرید سدیم	۴۳
۳۶-اسپری نازال رستانکس (مموتازون)	۴۴
۳۷-فنوباریتال	۴۵
۳۸-پودر اس امپرازول	۴۶
۳۹-دiazepam	۴۷
۴۰-قطره پدی لاک	۴۸
۴۱-پودر کیدیلاک	۴۹
۴۲-پودر سابولار	۵۰
۴۳-وان لایت	۵۱
۴۴-استامینوفن	۵۲
۴۵-والزومیکس	۵۳
۴۶-اسپری آترونت	۵۴
۴۷-اسپری سروفلو	۵۶
۴۸-استیل سیستین	۵۷
۴۹-برم هگزین	۵۸
۵۰-دکسترومتورفان	۵۹
۵۱-کوآموکسی کلاو	۶۰
۵۲-بتا هیستین	۶۱
۵۳-فولیک اسید	۶۲
۵۴-سیتیزین	۶۳
۵۵-کارودیلول	۶۴
۵۶-لوپل	۶۵
۵۷-نفروویت	۶۶
۵۸-انالاپریل	۶۷
۵۹-کلسیم	۶۸

نام دارو	شماره صفحه
۶۰- ویتامین ب ۱	۶۹
۶۱- پردنیزولون	۷۰
۶۲- گلی کلازید	۷۱
۶۳- لووتیروکسین	۷۲
۶۴- نیتروکانتین	۷۳
۶۵- والسارتان	۷۴
۶۶- مونته لوکاست	۷۵
۶۷- اسپیرونولاکتون	۷۶

متفورمین

متفورمین دارویی است که برای درمان علائم دیابت نوع ۲ استفاده می‌شود. دیابت نوع ۲ وضعیتی است که در آن بدن انسولین کافی تولید نمی‌کند یا انسولین تولید شده در بدن استفاده نمی‌شود. این اتفاق می‌تواند باعث افزایش سطح قند خون (هیپرگلیسمی) شود. در این شرایط داروی متفورمین با بهبود نحوه کنترل بدن در مواجهه با انسولین، سطح قند خون شما را کاهش می‌دهد.

نحوه عملکرد و مکانیسم اثر متفورمین چگونه است؟

عملکرد داروی متفورمین به این صورت است که به پاسخ مناسب بدن در برابر انسولین ترشح شده کمک می‌کند. این دارو همچنین میزان قند تولیدی کبد را کم کرده و میزان جذب قند توسط معده و روده را نیز کاهش می‌دهد.

نحوه مصرف متفورمین و دوز مصرفی آن

این دارو را به صورت خوراکی معمولاً روزی ۱ الی ۳ بار همراه با غذا مصرف کنید (طبق دستور پزشک) موقع مصرف این دارو مایعات زیادی بنوشید.

اگر دوز مصرفی داروی متفورمین را فراموش کردید، در اولین زمان ممکن آن را مصرف کنید. اما اگر نزدیک به مصرف دوز بعدی، به یاد آوردید که دارو را مصرف نکرده‌اید، نیازی به مصرف دو برابر دارو نیست و فقط دوز مقرر را مصرف کنید.

مضرات و عوارض جانبی قرص متفورمین هیدروکلراید

مصرف متفورمین ممکن است منجر به عوارضی مانند تهوع، استفراغ، ناراحتی معده، اسهال، ضعف یا طعم گس دهان شود. اگر هر یک از این عوارض ادامه یافت یا بدتر شد به سرعت با پزشک خود تماس بگیرید. بروز ناراحتی معده بعد از روزهای اولیه مصرف این دارو ممکن است نشانه لاکتیک اسیدوز باشد. سایر عوارض رایج مصرف متفورمین عبارتند از:

- **افت قند خون:** نشانه‌های قند خون پایین شامل تعرق، لرزش، تپش قلب بالا، ضعف، تاری دید، سرگیجه، سوزش دست و پا می‌شود. توصیه می‌شود همواره با خود قرص‌ها یا ژل گلوکز برای درمان قند خون پایین به همراه داشته باشید. اگر به هیچ محصول مطمئن گلوکزی دسترسی ندارید، با مصرف منابع قند مانند قرص‌های قند، عسل، آبنبات و یا نوشیدن آب میوه و نوشابه غیررژیمی می‌توانید قند خون خود را بالا بیاورید.
- **افزایش قند خون ناگهانی:** علائم قند خون بالا (هایپرگلیسمی) شامل تشنگی، افزایش دفعات ادرار، سرگیجه، سوزش، تنفس سریع و بوی میوه‌ای دهان است. اگر هر کدام از این علائم را به عنوان عوارض قطع ناگهانی متفورمین مشاهده کردید با پزشک خود تماس بگیرید.
- لازم است بدانید که واکنش آلرژیک جدی در مورد داروی متفورمین نادر است. با این وجود اگر واکنش آلرژیک جدی‌ای مثل تب، تورم غدد لنفاوی، علائم پوستی، خارش، تورم (مخصوصاً در صورت، زبان و گلو)، گیجی شدید و اختلال تنفسی را تجربه کردید، سریعاً از فوریت‌های پزشکی کمک بگیرید.
- **قرص متفورمین در بارداری و شیردهی**

- در صورت صلاح دید پزشک فقط قابل استفاده میباشد

زیپمت

یک داروی کنترل کننده قند خون است. این دارو یک قرص خطدار است که به عنوان یک داروی ترکیبی برای zipmet زیپمت یا تجویز می شود. ترکیبات تشکیل دهنده قرص زیپمت دو ترکیب مهم کاهش قند خون در بیماران دیابتی و کاهش نشانه های دیابت قرص متفورمین برای چیست؟ (این دارو توسط پزشک برای بیمارانی که به) داروهای ضد قند یعنی سیتاگلیپتین و متفورمین است دیابت نوع دو مبتلا هستند تجویز می شود. با مصرف قرص زیپمت میزان گلوکز خون به میزان زیادی کاهش می یابد. داروی زیپمت نام تجاری یکی از داروهای ضد قند داخلی است

نحوه مصرف داروی زیپمت

نحوه استفاده از هر دارو برای هر فرد بر اساس شرایطی که دارد توسط پزشک تعیین می شود. همچنین دستورالعمل های نوشته شده در بروشور همراه دارو مشخص می کند که زیپمت را باید به چه شکلی مصرف کرد. به صورت معمول نحوه مصرف داروی زیپمت دو بار در روز و همراه با غذاست. طریقه مصرف آن هم به صورت خوراکی است .

در حین مصرف این دارو مایعات زیادی بنوشید مگر اینکه پزشکتان دستور دیگری بدهد. قبل از مصرف قرص را نشکنید یا آن را برش ندهید .

بهترین زمان برای مصرف داروی زیپمت به همراه غذاست، چرا که می تواند میزان ناراحتی های گوارشی احتمالی را کاهش دهد

عوارض جانبی مصرف داروی زیپمت

با مصرف هر دارویی احتمال بروز یک سری عوارض جانبی هم وجود دارد. در برخی از افراد با مصرف داروی زیپمت حالت تهوع، استفراغ، ناراحتی معده، اسهال، سردرد، ضعف یا طعم فلزی در دهان ممکن است رخ دهد. به صورت معمول ناراحتی های معده پس از روزهای اول درمان می تواند نشانه بروز اسیدوز لاکتیک باشد. سایر علائم ممکن است شامل علائم عفونت مجاری تنفسی، یبوست و درد عضلانی باشد

یک سری عوارض جدی تر در صورت مصرف داروی زیپمت شامل واکنش های آلرژیک از جمله بثورات پوستی، کهیر، و تورم صورت، لب ها، زبان و گلو است که ممکن است باعث مشکل در تنفس یا بلع شود. معده درد شدید و مداوم، اغلب همراه با حالت تهوع و استفراغ نیز می تواند یکی از عوارض مصرف این دارو در برخی از افراد باشد. اینها ممکن است علائم پانکراتیت باشند. پانکراتیت یک وضعیت پزشکی جدی و بالقوه تهدیدکننده زندگی است

مصرف داروی زیپمت در بارداری

هنوز مطالعات کاملی در خصوص نحوه اثر زیپمت در دوران بارداری انجام نشده است. به همین دلیل زنان باردار باید در خصوص مصرف این دارو محتاط باشند و تنها در صورت لزوم با مشورت پزشک این دارو را مصرف کنند.

تداخلات دارویی قرص زیپمت

- داروهای مسدودکننده بتا مانند: متورال / پروپرانول
- قطره های چشمی مانند تیمیدول
- دیگوکسین
- داروهای مهارکننده کربنیک انیدراز
- انسولین
- کورتیکواستروئیدها

گلورپا

این دارو از دسته داروهای مهار کننده باز جذب گلوکز-سدیم به شمار می رود که از طریق مهار باز جذب گلوکز در کلیه باعث کاهش قند خون می شود

موارد مصرف گلورپا

این دارو در دیابت نوع ۲ برای کنترل قند خون و کاهش خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی استفاده می شود

مصرف در بارداری و شیردهی

بارداری : مطالعات کافی و به خوبی کنترل شده در زنان باردار انجام نشده است. مصرف این دارو به خصوص طی ۳ ماهه دوم و سوم بارداری توصیه نمی شود

شیردهی : در مورد ترشح این دارو در شیر انسان اطلاعاتی در دسترس نمی باشد. به دلیل احتمال بروز عوارض ناخواسته جدی در نوزاد شیرخوار، مصرف آن در دوران شیردهی توصیه نمی گردد

موارد منع مصرف:

حساسیت به امپاگلیفلوزین یا هر یک از مواد متشکله این دارو

نارسایی شدید کلیوی

بیماران تحت دیالیز

مرحله انتهایی بیماری کلیوی

دیابت نوع یک

کتواسیدوز دیابتی (افزایش کتون ها در خون یا ادرار)

تداخل های دارویی :

قبل از مصرف این دارو، چنانچه از داروهای زیر استفاده می کنید، پزشك خود را مطلع سازید:

آندروژن ها (به غیر از دانازول)، انسولین و سایر داروهای کاهنده قند خون، پگوسومات - با مصرف توام داروها، اثر کاهنده قند خون امپاگلیفلوزین ممکن است افزایش یابد

کورتیکواستروئیدهای سیستمیک، دانازول، سوماتروپین - با مصرف توام داروها، اثر کاهنده قند خون امپاگلیفلوزین ممکن است کاهش یابد

بلوکستین، لوودوپا - با مصرف توام داروها، اثر کاهنده فشار خون وضعیتی ناشی از مصرف این داروها ممکن است افزایش یابد

داروهای کاهنده فشار خون - با مصرف همزمان داروها، عوارض جانبی و سمیت سایر داروهای کاهنده فشار خون ممکن است افزایش یابد

هورمون های لوتئینه کننده، آنالوگ های ترشح کننده هورمون، داروهای مدر تیازیدی - با مصرف همزمان داروها، اثر درمانی امپاگلیفلوزین ممکن است کاهش یابد

انسولین نوورپید (آبی)

موارد مصرف انسولین نوورپید

انسولین نوورپید یک نوع انسولین سریع‌الاث‌ر است که برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت طراحی شده است. انسولین آسپارت به بدن کمک می‌کند تا گلوکز (قند خون) را از خون به سلول‌ها منتقل کند و از آن به عنوان انرژی استفاده کند

چه زمانی نوورپید تزریق می‌شود؟

قبل از غذا: معمولاً نوورپید بلافاصله قبل از هر وعده غذایی تزریق می‌شود تا افزایش قند خون ناشی از مصرف غذا را کنترل کند. این به افراد مبتلا به دیابت اجازه می‌دهد تا از غذاهای خود لذت ببرند و در عین حال قند خون خود را در محدوده سالم نگه دارند

نکات مهم در استفاده از نوورپید

نظارت بر قند خون: به طور مرتب قند خون خود را با دستگاه گلوکومتر اندازه گیری کنید تا مطمئن شوید که دوز انسولین شما مناسب است

رژیم غذایی: یک رژیم غذایی سالم و متعادل به همراه فعالیت بدنی منظم به کنترل قند خون کمک می‌کند

عوارض انسولین نوورپید

انسولین نوورپید به عنوان یک داروی موثر در کنترل قند خون، به طور کلی ایمن است. اما مانند هر داروی دیگری، ممکن است عوارضی را به همراه داشته باشد

عوارض شایع

هیپوگلیسمی (قند خون پایین): شایع‌ترین عارضه جانبی انسولین است. علائم آن شامل لرزش، تعریق، گرسنگی شدید، سرگیجه، تاری دید و حتی از دست دادن هوشیاری است

واکنش‌های آلرژیک در محل تزریق: قرمزی، تورم، خارش و درد در محل تزریق ممکن است رخ دهد. این واکنش‌ها معمولاً خفیف هستند و با گذشت زمان برطرف می‌شوند

موارد منع مصرف انسولین نوورپید

انسولین نوورپید یک داروی بسیار مهم برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت است. با این حال، مانند هر داروی دیگری، مواردی وجود دارد که استفاده از آن منع شده است

انسولین لانتوس (طوسی)

انسولین لانتوس نسخه‌ای از یک انسولین طولانی اثر ساخته دست بشر است که برای کنترل قند خون بالا در بزرگسالان و کودکان مبتلا به دیابت استفاده می‌شود. قبل از شروع استفاده از لانتوس، پزشک خود را در مورد تمام شرایط پزشکی خود، از جمله مشکلات کبدی یا کلیوی قرار دهید.

کنترل قند خون بالا کمک می‌کند از آسیب‌های کلیوی، نابینایی، مشکلات عصبی، از دست دادن اندام و مشکلات عملکرد جنسی جلوگیری به عمل آید. همچنین کنترل مناسب دیابت ممکن است خطر حمله قلبی یا سکته قلبی را کاهش دهد.

موارد مصرف آمپول لانتوس چیست؟

لانتوس یک انسولین طولانی اثر است که برای درمان **بیماری قند خون** یا دیابت نوع ۲ بزرگسالان و اطفال مبتلا به دیابت نوع ۱ استفاده می‌شود. در مورد مصرف آن باید گفت که این دارو را با دیگر داروهای انسولین یا درمان بیماری دیابت ترکیب نکنید، همچنین از یک سرنگ برای استفاده داروها استفاده نکنید.

دوز مصرفی انسولین لانتوس

دوره درمان و دوز مصرفی به وضعیت بیماری و پاسخ‌دهی بدن شما به درمان بستگی دارد. هر دوز مصرفی را به دقت اندازه‌گیری کنید و دقیقاً به اندازه میزان تجویزی توسط پزشک را مصرف کنید. کوچکترین تغییر در میزان انسولین مصرفی ممکن است تأثیر زیادی بر قند خون شما بگذارد.

عوارض جانبی آمپول انسولین لانتوس چیست؟

در صورتی که پزشک داروی لانتوس را برای شما تجویز کرده است مطمئن باشید فواید آن بیش از مضراتش بوده است. همچنین لازم است بدانید اکثر افرادی که داروی لانتوس را مصرف کرده اند، عوارض جدی این دارو را تجربه نکرده اند.

- موقع تزریق لانتوس ممکن است عوارضی مانند درد متوسط، قرمزی و التهاب به وجود بیاید. اگر هر یک از این عوارض ادامه یافت یا بدتر شد به سرعت با پزشک خود تماس حاصل کنید.
- در صورت مشاهده عوارض جانبی خطرناکی مانند نشانه‌های کمبود سطح پتاسیم خون (گرفتگی ماهیچه‌ها، ضعف و تپش قلب نامنظم) سریعاً با پزشک تماس بگیرید.
- علائم قند خون بالا (هایپرگلیسمی) شامل تشنگی، افزایش حجم ادرار، سرگیجه، سوزش، تنفس سریع و بوی میوه‌ای دهان است. اگر هر کدام از این علائم را مشاهده کردید با پزشک خود تماس بگیرید. ممکن است پزشکتان دوز مصرف این دارو را افزایش دهد.
- واکنش آلرژیک جدی و افت قند خون و کما در مورد داروی لانتوس نادر است. با این وجود اگر واکنش آلرژیک جدی‌ای مثل علائم پوستی، خارش، تورم (مخصوصاً در صورت، زبان و گلو)، گیجی شدید و اختلال تنفسی را تجربه کردید، سریعاً از فوریت‌های پزشکی کمک بگیرید.

تداخلات دارویی آمپول لانتوس با داروهای دیگر

تداخلات دارویی ممکن است عملکرد و تأثیر داروی لانتوس را تغییر دهد یا باعث افزایش ریسک بروز عوارض جانبی آن شود. این مقاله شامل تمامی تداخلات دارویی ممکن، نیست لذا لیست تمامی داروهای مصرفی‌تان از جمله داروهای تجویزی، داروهای بدون نسخه و داروهای گیاهی را با پزشک یا داروساز در میان بگذارید و بدون صلاحدید پزشک شروع به مصرف، قطع یا تغییر دوز داروی لانتوس نکنید.

- قطره‌های چشمی درمان آب سیاه مانند تیمولول
- داروهای ضد روان پریشی (مانند آریپیپرازول، کاریپرازین، کلوزاپین، هالوپریدول، الانزاپین، کوتیپین، ریسپریدون)
- استروئیدهای آنابولیک (به عنوان مثال، تستوسترون)
- بتا بلوکرها (مانند آتنولول، متوپرولول، پیندولول، پروپرانولول، سوتالول)

انسولین رگولار

انسولین رگولار یکی از انواع انسولین‌های کوتاه‌اثر است که برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت استفاده می‌شود. این انسولین شباهت زیادی به انسولین طبیعی بدن دارد و با کمک به جذب گلوکز توسط سلول‌ها، سطح قند خون را کاهش می‌دهد. انسولین رگولار حدود ۳۰ دقیقه پس از تزریق شروع به اثرگذاری می‌کند و اثر آن بین ۲ تا ۴ ساعت به اوج می‌رسد و تا ۶ تا ۸ ساعت باقی می‌ماند.

این نوع انسولین معمولاً قبل از غذا تزریق می‌شود تا از افزایش قند خون بعد از وعده غذایی جلوگیری کند. در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ و ۲، انسولین رگولار به منظور تنظیم دقیق سطح قند خون استفاده می‌شود.

موارد مصرف انسولین رگولار

آمپول انسولین رگولار به عنوان یکی از انواع انسولین کوتاه‌اثر، نقش بسیار مهمی در کنترل قند خون افراد مبتلا به دیابت ایفا می‌کند.

۱- دیابت نوع ۱

۲- دیابت نوع ۲

۳- دیابت بارداری : در بعضی از موارد، زنان باردار به دلیل تغییرات هورمونی ممکن است به انسولین نیاز پیدا کنند. انسولین رگولار به دلیل اثر سریع و قابل پیش‌بینی، برای کنترل قند خون در دوران بارداری مناسب است.

عوارض انسولین رگولار

انسولین رگولار یکی از داروهای حیاتی برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت است. با این حال، مانند هر داروی دیگری، ممکن است عوارضی را به همراه داشته باشد.

عوارض شایع:

هیپوگلیسمی (افت قند خون): شایع‌ترین عارضه جانبی انسولین است. علائم آن شامل لرزش، عرق کردن، گرسنگی شدید، سرگیجه، تپش قلب، سردرد، تاری دید، اختلال در گفتار، خواب‌آلودگی، تحریک‌پذیری، ضعف عضلانی و از دست دادن هوشیاری است.

تغییرات در محل تزریق: ممکن است در محل تزریق، قرمزی، تورم، خارش یا درد ایجاد شود. در موارد نادر، لیپودستروفی (تغییر بافت چربی در محل تزریق) ممکن است رخ دهد.

تداخلات دارویی انسولین رگولار

داروهای ضد دیابت خوراکی: این داروها معمولاً با انسولین همراه می‌شوند و تداخلات پیچیده‌ای ممکن است رخ دهد.

داروهای ادرارآور (دیورتیک‌ها): این داروها با افزایش دفع آب از بدن، می‌توانند باعث افزایش قند خون شوند.

کورتیکواستروئیدها (مانند پردنیزون): این داروها باعث افزایش تولید گلوکز در کبد می‌شوند و در نتیجه نیاز به انسولین را افزایش می‌دهند.

بتابلوکرها: این داروها می‌توانند علائم هیپوگلیسمی را ماسک کنند.

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی: این داروها می‌توانند بر اثر انسولین تأثیر بگذارند.

داروهای ضد افسردگی: برخی از این داروها می‌توانند بر متابولیسم گلوکز تأثیر بگذارند.

انسولین ان پی اچ

انسولین ان پی اچ یکی از انواع انسولین‌های متوسط‌الثر است که برای کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت استفاده می‌شود. این انسولین به طور معمول به عنوان انسولین پایه تجویز می‌شود تا سطح قند خون را بین وعده‌های غذایی و در طول شب ثابت نگه دارد

موارد مصرف دقیق‌تر انسولین ان پی اچ

۱- دیابت نوع ۱

۲- دیابت نوع ۲

۳- دیابت بارداری

عوارض شایع انسولین ان پی اچ

- **هیپوگلیسمی (افت قند خون):** این شایع‌ترین عارضه جانبی انسولین است. زمانی رخ می‌دهد که سطح قند خون بیش از حد کاهش یابد. علائم هیپوگلیسمی شامل لرزش، تعریق، تپش قلب، گرسنگی شدید، سرگیجه، سردرد، تاری دید و در موارد شدید، تشنج و از دست دادن هوشیاری است.
- **واکنش‌های آلرژیک موضعی:** قرمزی، تورم و خارش در محل تزریق از عوارض جانبی رایج انسولین هستند. این واکنش‌ها معمولاً خفیف هستند و با گذشت زمان برطرف می‌شوند.
- **افزایش وزن:** بسیاری از افراد مبتلا به دیابتی که از انسولین استفاده می‌کنند، افزایش وزن را تجربه می‌کنند. این به دلیل مکانیسم عمل انسولین و ذخیره گلوکز در بدن است.
- **لیپودیستروپی:** این عارضه به تغییرات در بافت چربی زیر پوست در محل تزریق اشاره دارد. ممکن است به صورت گود افتادگی یا برجستگی در پوست ظاهر شود.

گروه‌های دارویی که با انسولین ان پی اچ تداخل دارند:

- **کورتیکواستروئیدها:** داروهای مانند پردنیزولون و دکزامتازون می‌توانند سطح قند خون را افزایش دهند و نیاز به انسولین را بیشتر کنند.
- **هورمون‌های تیروئیدی:** داروهای که برای درمان کم‌کاری تیروئید استفاده می‌شوند، می‌توانند متابولیسم را افزایش داده و در نتیجه نیاز به انسولین را بالا ببرند.
- **داروهای ادرارآور:** برخی از داروهای ادرارآور می‌توانند باعث افزایش قند خون شوند.
- **داروهای بتابلوکر:** این داروها می‌توانند علائم هشداردهنده افت قند خون (هیپوگلیسمی) را ماسک کنند و در نتیجه خطر هیپوگلیسمی را افزایش دهند.
- **داروهای ضد روان‌پزشکی:** برخی از این داروها می‌توانند بر متابولیسم گلوکز تأثیر بگذارند و نیاز به انسولین را تغییر دهند.
- **داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی:** مصرف طولانی‌مدت این داروها می‌تواند بر کنترل قند خون تأثیر بگذارد.

قرص اسپرین چیست و چرا مصرف می‌شود؟

داروی اسپرین یکی از داروهایی است که برای کاهش درد (مسکن) و پیشگیری از سکتته‌ی مغزی کاربرد دارد. این دارو از انواع مسکن‌های ضد التهابی غیراستروئیدی است

تسکین درد (درد خفیف دندان/ سردرد بی دلیل)

کاهش تب

کاهش التهاب

پیشگیری از حمله قلبی و سکتته

کاهش علائم آرتریت روماتوئید یا علائم روماتیسم

پیشگیری از میگرن

عوارض اسپرین چیست؟

قرص آ اس آی یکی از دلایل رایج مسمومیت در کودکان است. از عوارض رایج استفاده از اسپرین که در بعضی موارد با مصرف دارو همراه با شیر یا غذا برطرف می‌شود در زیر نوشته شده‌اند. اگر هریک از این عوامل ادامه پیدا کرد یا تشدید شد، سریعاً به پزشک مراجعه فرمایید

ناراحتی معده مثل افراد با علایم زخم معده (تهوع)

سوزش سر دل

معده درد و حالت تهوع

سوزش سردل

در صورتی‌که پزشک داروی اسپرین را برای شما تجویز کرده‌است، مطمئن باشید فوائد آن بیش از مضراتش بوده‌است. همچنین لازم است بدانید اکثر افرادی که اسپرین را مصرف کرده‌اند، عوارض جدی این دارو را تجربه نکرده‌اند

چنانچه با عوارضی جدی، نظیر

خونریزی سریع و کبودی

مشکلات شنوایی

وزوز گوش

نشانه‌های مشکلات کلیوی مثل تغییر میزان ادرار

تهوع و استفراغ مزمن و شدید

خستگی بی‌دلیل

سرگیجه

ادرار تیره

و زردی چشم یا پوست مواجه شدید،

بلافاصله به پزشکتان اطلاع‌دهید. مصرف اسپرین گاهی ممکن است باعث خونریزی معده، روده یا خونریزی سایر اعضای بدن شود

موارد ذیل نشان‌دهنده‌ی بروز یکی از عوارض جانبی جدی و شدید داروی آ اس آ است و پس از مشاهده‌ی هرکدام از آنها سریعاً به پزشک مراجعه کنید:

مدفوع سیاه و قیری‌رنگ

درد مزمن و شدید شکم و معده

وجود لکه‌های قهوه‌ای‌رنگ در استفراغ

لکنت زبان

ضعف و بی‌حسی در یک سمت بدن

اختلال ناگهانی در دید

سردرد ناگهانی و شدید

واکنش آلرژیک به داروی آسپرین بسیار کم است و به‌ندرت اتفاق می‌افتد. با این وجود، اگر متوجه هریک از علائم حساسیت دارویی، مثل

علائم پوستی

خارش

(تورم) (مخصوصاً در صورت، زبان و گلو)

گیجی شدید

و اختلال تنفسی شدید،

موارد احتیاط مصرف آسپرین

هموفیلی

K کمبود ویتامین

پایین بودن پلاکت خون

تداخلات دارویی آسپرین

داروهای زیر ممکن است با داروی آسپرین تداخل داشته باشند؛ در صورت مصرف این داروها، پزشک خود را مطلع سازید:

- استازولامید
- سایر داروهای انعقاد خون، مثل وارفارین هپارین
- کورتیکواستروئید، مثل پردنیزون
- (داروهای گیاهی، مثل جینکو (کهن‌دار
- کنترولاک
- متوترکسات
- میفپریستون
- والپروات

اگر به‌تازگی یکی از واکسن‌های زنده، مثل واکسن آنفولانزا یا واکسن آبله مرغان را تزریق کرده‌اید، پیش از مصرف آسپرین با پزشک مشورت کنید

قرص پلاویکس (کلوپیدوگرل)

قرص پلاویکس با نام ژنریک کلوپیدوگرل یکی از داروهای مهم و پرکاربرد در حوزه پیشگیری و درمان بیماری‌های قلبی و عروقی است. این قرص به دسته داروهای ضد پلاکت تعلق دارد و برای جلوگیری از تشکیل لخته‌های خونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پزشک متخصص معمولاً این دارو را برای بیماران مبتلا به بیماری‌های شریان کرونری قلب، سکته مغزی و سندرم حاد کرونری تجویز می‌کند.

موارد مصرف قرص پلاویکس

-حمله قلبی

-سکته مغزی ایسکمیک

-بیماری‌های شریانی محیطی

-سندرم های حاد کرونری

-بیماری‌های شریان کرونری

-پساز قرار دادن استنت های قلبی (فنر)

موارد احتیاط و منع مصرف قرص پلاویکس

در صورت داشتن شرایط و بیماری‌های زیر، باید پلاویکس را با احتیاط مصرف کنید:

- حساسیت به ترکیبات دارویی کلوپیدوگرل
- سابقه خونریزی شدید ناشی از زخم معده
- مشکلات کبدی
- قبل از هر نوع جراحی
- مصرف همزمان با مکمل‌های گیاهی

عوارض قرص کلوپیدوگرل

- سرگیجه
- سردرد
- اسهال
- تهوع و استفراغ
- ناراحتی معده
- خواب‌آلودگی
- قرمزی پوست و آکنه
- کبودی‌های غیر معمول
- واکنش آلرژیک بدن مانند تورم صورت، لب‌ها، زبان یا گلو، کهیر و خارش

علائمی همچون خونریزی بیش از حد لثه، وجود خون در ادرار و مدفوع، خونریزی از معده یا روده، میوزیت (عوارض عضلانی) و خون‌مردگی گسترده در زیر پوست از عوارض جدی پلاویکس هستند. در صورت مشاهده هر یک از این علائم، سریعاً مصرف دارو را قطع کنید و به پزشک اطلاع دهید.

قرص ریواروکسابان چیست؟

ریواروکسابان به دسته داروهای ضد لخته‌گی تعلق دارد که عملکرد آن مسدود کردن نوع خاصی از پروتئین‌های لخته‌گی در خون است.

ریواروکسابان برای جلوگیری از ایجاد لخته‌های خونی ناشی از بیماری تپش قلب نامنظم (مانند فیبریلاسیون دهلیزی مزمن) و عمل جراحی جایگزینی مفصل زانو یا ران مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین از این دارو برای درمان لخته‌های خونی استفاده می‌شود و لخته شدن خون جلوگیری می‌کند.

عوارض قرص ریواروکسابان چیست؟

مصرف ریواروکسابان ممکن است منجر به عوارضی مثل کبودی یا خونریزی‌های کوچک (مانند خون دماغ شدن، خونریزی از خراش‌ها و بریدگی‌ها) شود. اگر هر کدام از حالت‌ها تشدید شد یا بهبود نیافت با پزشک مشورت کنید.

این دارو ممکن است از طریق تاثیرگذاری بیش از حد بر روی پروتئین‌های لخته‌گی خون موجب خونریزی‌های خطرناکی شود. اگر هر نشانه‌ای از خونریزی جدی مانند

- درد یا تورم یا ناراحتی غیر طبیعی
- کبودی غیر معمول
- خونریزی طولانی از زخم‌ها یا لثه‌ها
- خونریزی مداوم و طولانی بینی
- خونریزی بیش از حد در دوره قاعدگی
- ادرار تیره یا صورتی
- سرفه خونی
- استفراغ خونی یا به رنگ قهوه
- سردرد شدید
- سرگیجه و از هوش رفتن
- خستگی مداوم یا بی‌دلیل
- ضعف
- مدفوع سیاه و خون

و مشکلات بلعیدن را مشاهده کردید سریعاً با پزشک تماس حاصل کنید.

تداخلات دارویی ریواروکسابان با داروهای دیگر

- میفریستون
- برخی از داروهای ضد افسردگی شامل داروهای دس‌ونلافاکسین یا ونلافاکسین فلوکسیتین

برخی از داروها بر روی دفع این دارو از بدن تاثیر می‌گذارند و این کار بر عملکرد دارو تاثیر می‌گذارد. این داروها شامل موارد زیر می‌شوند:

- کوبیسیتات و کنبیوپتان
- ضد قارچ‌های آزول مانند ایتراکونازول، کتوکنازول و پساکونازول
- ریفامپین
- مهارکننده‌های آنزیم پروتئاز مانند آتازاناویر، ریتوناویر و ساکویناویر
- عصاره‌ی گل راعی
- داروهای ضد تشنج مانند فنی توئین، فنوباربیتال و کاربامازپین

○ آمپول انوکسپارین یا پدکسان یا سلگزان

- این فرآورده دارویی یک داروی ضد انعقاد از خانواده های هپارین با وزن ملکولی پائین است، این دارو از تشکیل لخته (ترومبوز) در یک سیاهرگ یا سرخرگ و همچنین عود آن پیش گیری می کند. در مواد زیر مصرف این دارو توصیه نمی

شود:

- چنانچه نارسایی شدید کلیه دارید -
- طی ۲۴ ساعت اول پس از خونریزی مغزی -
- اگر سن بیمار بیش از ۶۵ سال است، -
- در ترکیب با آسپرین (در مقادیر مورد استفاده برای درد و تب)، داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی یا دکستران -
- **در موارد زیر مصرف این دارو ممنوع است**
- چنانچه به این فرآورده دارویی ، هپارین یا مشتقات هپارین از جمله سایر هپارین های باوزن ملکولی پائین حساسیت دارید -
- (چنانچه سابقه کاهش تعداد پلاکت ها در اثر مصرف هپارین داشته اید. (پلاکت ها نقش مهمی در تشکیل لخته خونی دارند -
- چنانچه اختلال انعقادی شناخته شده دارید -
- چنانچه هرگونه جراحت (داخلی یا خارجی) دارید که ممکن است خونریزی کند -
- چنانچه خونریزی بیش از اندازه دارید -

○ احتیاط در مصرف دارو

- در برخی موارد، به ویژه در درمان، ممکن است خطر خونریزی در شرایط زیر وجود داشته باشد: - بیمار سالمند
 - وزن کمتر از ۴۰ کیلو گرم -
 - نارسایی کلیه -
 - چنانچه درمان بیش از ۱۰ روز ادامه داشته باشد -
 - بی حسی نخاعی یا اپیدروال : زمانی که این دارو پیش گیرانه تجویز شود منع نشده است ، اگرچه باید احتیاط خاصی را -
- اعمال نمود شامل: رعایت فاصله زمانی بین تزریق و بی حسی و پایش ویژه بیمار

○ تداخل با سایر داروها و دیگر تداخل ها

○ آسپرین -

○ داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی -

○ مهار کنند تجمع پلاکت ها (مانند تیکلوپیدین) -

○ دکستران (از داروهای مورد استفاده در مراقبت های ویژه) -

○ ضد انعقاد های خوراکی (که ویتامین "ک" را مهار می کنند) -

○ عوارض جانبی

○ انوکسپارین ممکن است سبب ایجاد برخی عوارض ناخواسته گردد. در صورت بروز هر یک از علائم زیر با پزشک خود

مشورت کنید:

○ تهوع، استفراغ، ناراحتی معده و اسهال. در صورت وقوع هر یک از علائم یا نشانه های زیر، مصرف دارو را قطع و -

بلافاصله به پزشک خود مراجعه کنید

○ کاهش هوشیاری، ضعف پاها، بی حسی یا گزگز شدن انتهایها، تب، بثورات پوستی، کهیر یا خارش، قرمزی یا تورم در -

ناحیه تزریق، خونریزی لثه ها، استفراغ خونی یا محتوی دانه های قهوه ای، مدفوع خونی یا سیاه قیری شکل، ادرار خونی،

ادرار قرمز یا قهوه ای تیره، اختلال کنترل ادرار یا مدفوع، خونریزی قاعدگی شدید، خونریزی یا کبود شدگی غیر طبیعی و هر

گونه علامت نگران کننده

○ نحوه ی تزریق انوکسپارین

○ اول دستان خود را با آب و صابون بشویید پس از تمیز کردن محل تزریق با الکل، اجازه دهید آن محل خشک شود. سپس

تزریق را آغاز کنید چون وجود رطوبت موجب افزایش احساس سوزش می شود. سرنگ را در دست خود گرفته و غلاف

پلاستیکی آن را با دقت بیرون بیاورید. دقت کنید که سوزن سرنگ به جایی برخورد نکند. چنانچه قطره از قسمت انتهایی سوزن

خارج شد پیش از تزریق با ضربه زدن بر روی سرنگ آن را برطرف کنید. تزریق را آغاز کنید قبل از تزریق سرنگ آماده

شده را هواگیری نکنید. تزریق در حالت ننشسته یا خوابیده انجام دهید. قسمتی از سطح شکم در طرف چپ و یا راست، از

پهلوها تا ۵ سانتی متر به ناف را انتخاب کنید زیرا دارای بافت زیر جلدی آزاد می باشد. پوست تمیز ناحیه شکم را با دست

دیگر خود به کمک انگشت شست و سیابه، نیشگون مانند بالا بیاورید. فشار ملایم ایجاد کنید تا فقط یک پشته ایجاد شود. سپس

سرنگ را در حالت ۹۰ درجه تا آخر وارد محل برجسته کنید. چین پوستی شکم را تا پایان تزریق به آرامی نگه دارید چون در این حالت دارو تنها وارد بافت چربی شکم می شود و به عضله نمی رسد. همانطور که محل برجسته در دست شماسست تزریق را به آرام و با دقت انجام دهید تا جایی که انوکسپارین موجود در سرنگ خالی شود. همانطور که محل برجسته در دست شماسست سرنگ را به آرامی و مستقیم بیرون بیاورید و سپس ناحیه تزریق را آزاد کنید. نوبت های بعدی را به صورت یک در میان در سمت چپ یا راست تزریق کنید. یعنی اگر دیروز در سمت راست شکم تزریق انجام شد امروز باید در سمت چپ تزریق صورت بگیرد و همینطور به تناوب ادامه می یابد. اگر چه در سایر نقاط نیز می توان تزریق را انجام داد مثلاً در عضله بازو، اما کناره های سطح شکم به علت جذب سریع دارو محل مناسبی برای تزریق می باشند. اگر احياناً تزریق انوکسپارین به جاي شکم در ناحیه بازو صورت گرفت باید این تزریق با زاویه ۴۵ درجه صورت بگیرد زیرا بافت زیر جلد بازو بسیار کمتر از شکم بوده و در تزریق ۹۰ درجه احتمال ورود دارو به عضله وجود دارد.

○ پس از تزریق

- این امکان وجود دارد که تا حدود ۲۰ دقیقه بعد از تزریق در محل تزریق احساس سوزش و گزگز کنید. این مسئله طبیعی بوده و جاي هیچ نگران نیست. فقط ناحیه تزریق را نخارانید و با دست آن را فشار ندهید چرا که بعداً در اطراف ملت تزریق شاهد کبودی خواهید شد.

○ هشدارهای ویژه

- (درمان مستلزم انجام آزمایش های مکرر خون برای کنترل منظم تعداد پلاکت های خون است. (معمولاً دوبار در هفته -
- در مدت درمان، ممکن است در موارد بسیار نادری کاهش چشمگیر تعداد پلاکت های خونی اتفاق بیفتد، در این مورد نیاز به - قطع درمان و افزایش پایش بیمار است چرا که احتمال بروز پیچیدگی های جدی و متناقض، به ویژه ترومبوز وجود دارد.
- در افراد مبتلا به عفونت حاد یا بیماری رماتیسمی حاد، درمان فقط در صورتی مجاز است که یکی از موارد صادق باشد: - سن ۷۵ سال، تومور، سابقه بیماری عروقی، چاقی، هورمون درمانی، نارسایی قلبی یا نارسایی مزمن تنفسی. این فرآورده: دارویی معمولاً برای کودکان توصیه نمی شود

- مصرف این دارو برای پیش گیری از وقایع ترومبوآمبولیک در آن دسته از بیماران، به ویژه زنان بارداری که دریچه - مصنوعی قلب دارند توصیه نمی شود

تاوانکس

موارد مصرف: این دارو در درمان عفونت‌های باکتریایی پوست (پیچیده و ساده)، سینوزیت حاد باکتریایی، کلیه، مثانه و پروستات

استفاده می‌شود. لووفلوکساسین همچنین در درمان بیماری‌های تنفسی با عامل عفونی باکتریال همچون برونشیت و ذات الریه

(پنومونی) استفاده می‌شود. لووفلوکساسین برای درمان بیماری‌های سیاه زخم و طاعون هم کاربرد دارد

تداخل‌های دارویی

داروهای ضد اسید حاوی آلومینیم، کلسیم، منیزیم، دیدانوزین، سولفات آهن، سوکرالفیت و روی - مصرف این داروها ممکن است

جذب لووفلوکساسین را کاهش دهد، بنابراین مصرف همزمان آنها توصیه نمی‌گردد. بهتر است مصرف هر یک از این داروها با

لووفلوکساسین حداقل ۲ ساعت فاصله باشد

داروهای ضد آریتمی : آمیودارون

داروهای ضد دیابت - در بیماران دیابتی تحت درمان با داروهای کنترل کننده قند خون یا انسولین، مصرف همزمان این

داروها با لووفلوکساسین ممکن است منجر به کاهش یا افزایش قند خون شود. لذا پایش میزان قند خون توصیه می‌گردد

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی - مصرف همزمان احتمال بروز تحریک سیستم اعصاب مرکزی و حملات تشنجی را

ممکن است افزایش دهد

داروهای کورتیکواستروئیدی - مصرف همزمان ممکن است منجر به پارگی تاندون‌های شانه، دست، آشیل یا سایر تاندون

ها گردد که نیاز به عمل جراحی بوده و یا آن که منجر به ناتوانی طولانی مدت به خصوص در افراد سالخورده می‌گردد

وارفارین - لووفلوکساسین باعث تشدید اثرات وارفارین می‌گردد

موارد منع مصرف

سابقه حساسیت به لووفلوکساسین

التهاب یا پارگی تاندون مربوط به مصرف داروهای گروه کینولون

..

..

قرص سیپروفلوکساسین چیست؟

به دسته‌ای از داروها با نام آنتی‌بیوتیک فلوروکینولونی گفته می‌شود که برای درمان عفونت‌های باکتریایی مانند عفونت ادراری یا تنفسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما تاکنون به عفونت‌های باکتریایی مبتلا شده باشید قطعاً با فرم‌های مختلف این دارو مانند قرص سیپروفلوکساسین ۲۵۰ یا ۵۰۰، آمپول، قطره چشمی و گوشی آن آشنا هستید.

کاربرد داروی سیپروفلوکساسین

این آنتی‌بیوتیک برای درمان عفونت‌های باکتریایی مفید است. اصلی‌ترین کاربرد قرص سیپروفلوکساسین شامل موارد زیر می‌شود:

1. قرص سیپروفلوکساسین در درمان عفونت ادراری استفاده می‌شود.
2. این دارو برای عفونت‌های تنفسی مثل عفونت ریه، حلق، گلو، برونشیت و سینوزیت بسیار مفید است.
3. برای درمان عفونت‌های پوست و بافت نرم مانند زخم‌های عمیق، آبسه و سوختگی‌ها از داروی سیپروفلوکساسین استفاده می‌کنند.
4. عفونت‌های استخوان و مفاصل با آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین ۵۰۰ درمان می‌شود.

عوارض قرص سیپروفلوکساسین
پزشک با در نظر گرفتن شرایط بیمار و وضعیت جسمانی او داروی سیپروفلوکساسین تجویز می‌کند. بنابراین احتمال بروز عوارض پس از مصرف داروی مذکور بسیار کم خواهد بود. با این حال خوب است عوارض جانبی داروی سیپروفلوکساسین را بشناسید:

- سردرد
- تهوع
- اسهال
- سرگیجه
- سبکی سر
- اختلال در خواب

تداخلات دارویی با سیپروفلوکساسین

(Warfarin) رقیق کننده خون مانند وارفارین

(dofetilide) دوفتیلید

(methenamine) متنامین

(quinidine) کینیدین

(sotalol) سوتالول

دارویی برای صرع (Phenytoin) فنی‌توئین

داروی گرفتگی عضلات (Tizanidine) تیزانیدین

(ferrous sulfate) مکمل آهن مانند فرس سولفات

داروی قلب (Amiodarone) آمیودارون

داروی دیابت

(Prednisolone) پردنیزولون

(Azithromycin) سایر آنتی‌بیوتیک‌ها مانند آزیترومایسین

داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی

لوزارتان

لوزارتان یکی از داروهایی است که به کاهش فشار خون کمک می‌کند و از قلب و کلیه‌ها محافظت می‌کند.

عوارض جانبی لوزارتان چیست؟

همه داروها ممکن است عوارض جانبی ایجاد کنند. اما بسیاری از مصرف‌کنندگان نیز هیچ نوع عارضه‌ای بروز نمی‌دهند. یکسری از عوارض نیز بعد از گذشت مدت کوتاهی از مصرف دارو، از بین می‌روند. در صورت بروز هریک از عوارض زیر با مصرف لوزارتان حتماً با پزشک معالج مشورت نمایید

علائم شبه آنفولانزا

سرفه خشک

کرامپ‌های عضلانی

درد در پاها و کمر

احساس خستگی

بی‌خوابی

سر درد

سرگیجه

اسهال

سوء هاضمه

احتقان بیرونی

سیوزیت

میالرژی

موارد منع مصرف داروی لوزارتان

حساسیت به این دارو یا دیگر داروها و مواد

بارداری

شیردهی

مشکلات کلیوی (مخصوصاً مشکلات مربوط به انسداد عروق کلیوی)

بیماری کبدی

نارسایی احتقانی قلب

دیابت

عدم تعادل در میزان الکترولیت‌ها (مانند کاهش میزان پتاسیم در بدن)

تداخلات دارویی

داروهای ادرار آور یا قرص آب

سایر داروهای مرتبط با فشارخون

... داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند: آسپرین، ناپروکسن، دیکلوفناک، ایبوپروفن، ملوکسیکام و

لنتیوم

سلوکوکسیب

داروهای افزایش دهنده سطح پتاسیم خون مانند بنازپریل، لیزینوپریل

قرصهای جلوگیری از بارداری حاوی دروسپرون

انواع قرص‌های رژیمی

قرص سرماخوردگی

داروهای ضدسرفه

آلیسکیرن

فروزمايد چيست؟

فروزمايد از دسته داروهای دیورتیک (مدر یا ادرار آور) است، که با افزایش حجم ادرار و مایعات دفعی بدن، می‌تواند در مواردی از جمله کاهش ورم موثر باشد؛ به همین دلیل به آن‌ها قرص آب هم گفته می‌شود. همچنین، فروزمايد با دفع مایعات اضافه در بدن که می‌تواند منجر به مشکلات تنفسی، خستگی و ورم شود، به بهبود شرایط بیمار کمک می‌کند. این داروها در درمان فشار خون بالا نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما فروزمايد تنها در صورت عدم کنترل فشار خون با داروهای دیگر از این گروه، تجویز می‌شود. همچنین، ممکن است این دارو به تنهایی یا همراه با دیگر داروهای مدر، توسط پزشک تجویز شود.

عوارض جانبی شایع فروزمايد

کاهش پتاسیم خون (هیپوکالمی): این عارضه می‌تواند منجر به ضعف عضلانی، خستگی، ضربان قلب نامنظم، گرفتگی عضلات و در موارد شدیدتر، مشکلات قلبی شود.

کاهش سدیم خون (هیپوناترمی): این عارضه می‌تواند باعث سردرد، گیجی، ضعف، تشنج و در موارد شدید، کما شود.

کاهش فشار خون: فروزمايد با افزایش دفع سدیم و آب، به کاهش فشار خون کمک می‌کند. در برخی افراد، این کاهش فشار خون ممکن است بیش از حد باشد و باعث سرگیجه، سبکی سر، غش و افت فشار خون وضعیتی شود.

تشنگی و خشکی دهان: افزایش دفع ادرار ناشی از مصرف فروزمايد می‌تواند باعث تشنگی و خشکی دهان شود.

اختلالات گوارشی: تهوع، استفراغ، اسهال، یبوست، درد شکم و کاهش اشتها از جمله عوارض گوارشی رایج فروزمايد هستند.

مشکلات کلیوی: در برخی موارد، فروزمايد می‌تواند به کلیه‌ها آسیب برساند، به خصوص در افرادی که قبلاً مشکل کلیوی داشته‌اند.

حساسیت به نور: مصرف فروزمايد ممکن است باعث افزایش حساسیت پوست به نور خورشید شود.

اختلالات شنوایی: در برخی موارد، مصرف فروزمايد می‌تواند باعث کاهش شنوایی موقت یا دائمی شود.

تداخلات دارویی فروزمايد

برومپریدول، کلرال هیدرات، دسموپرسین، اتاکرینیک اسید، فکسینیدازول، لوسولپرید، مکامیل‌آمین، پرومازین. کاهش اثرات فروزمايد توسط داروها: آلپسکایرن، آمفتامین‌ها، عوامل کمپلکس ساز اسیدهای صفراوی، بریگاتینیب، برومپریدول، دکس متیل فنیدات، فوس فنی‌توئین، گیاهان (با خاصیت افزایش فشارخون)، متوترکسات، متیل فنیدات، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، آگونیست‌های اپیوئید، فنی‌توئین، پروبنسید، سالیسیلات‌ها، سوکرالفیت، یوهیمبین. افزایش اثرات داروها توسط فروزمايد: برومپریدول، کابوزاتینیب، گلیکوزیدهای قلبی، سفوتیام، سفپیروم، سفتی‌زوکسیم، سفالوتین، کلرال بتائین، کلرال هیدرات، سیس پلاتین، دسموپرسین، دی‌کلروفنامید، دوفتیلید، دولوکستین، اتاکرینیک اسید، فوسکارنت، داروهای کاهنده فشارخون، ایوابرادین، فرآورده‌های حاوی لوودوپا، لوسولپرید، متوترکسات، داروهای مسدودکننده عصبی – عضلانی، نیتروپروسید، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی، فولکودین، پرومازین، ریسپریدون، سالیسیلات‌ها، سدیم فسفات‌ها، تویرامایسین. افزایش اثرات فروزمايد توسط داروها: شیرین‌بیان، لورمتازپام، متوترکسات، مولسی‌دومین، نفتوپیدیل، نیکرگولین، نیکوراندیل، نیتیزنون، اوبینوتوزومب، آگونیست‌های اپیوئید، پنتوکسی‌فیلین، مهارکننده‌های فسفودی استراز ۵، پرتومانید، پروبنسید، آنالوگ‌های پروستاگلین، کیناگولید، ربوکستین، تری‌فلونامید، تولوایتان، زیپامی.

داروی آتورواستاتین چیست؟

آتورواستاتین یکی از داروهای موثر در کاهش سطح کلسترول و چربی خون است که به گروه داروهای استاتین تعلق دارد. این دارو با مهار آنزیمی که در تولید کلسترول نقش دارد، میزان چربی‌های ناسالم در خون را کاهش می‌دهد و از تجمع آنها در عروق جلوگیری می‌کند؛

تداخلات دارویی آتورواستاتین

داروهایی که برای ایدز یا هپاتیت

توکونازول، ایترونازول (اسپورانکس، تولسورا)، پوزاکونازول (نوکسیفیل) یا ووریکونازول که برای درمان عفونت‌های قارچی به‌کار می‌روند

آنتی‌بیوتیک ماکرولید مانند کلاریترومایسین و اریترومایسین که در درمان عفونت‌های باکتریایی کاربرد دارند

کولچیسین که به‌طور معمول برای نقرس استفاده می‌شود

سیکلوسپورین (گنگراف، نئورال، سندایم) که سیستم ایمنی بدن را سرکوب می‌کند

دیگوکسین (لاتوکسین) که برای درمان ضربان نامنظم قلب و برخی انواع نارسایی قلب است

نیاسین یا فیبرات مانند جم فیبروزیل (لوپید)، فنو فیبرات (تری‌کور) یا فنو فیبریک اسید (فیبرکون، تریلیپیکس) که داروهایی برای کلسترول بالا هستند

ریفامپین که به‌طور معمول برای درمان عفونتی به نام سل استفاده می‌شود

قرص ضدبارداری

عوارض جانبی شایع آتورواستاتین

گرفتگی یا آبریزش بینی، گلودرد

درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان گونه

اسپاسم یا درد عضلانی

درد مفاصل

سررد

اسهال

ناراحتی معده

درد در بازوها و پاها

کمر درد یا پهلودرد

(UTI) عفونت دستگاه ادراری

ادرار دردناک یا دشوار

سوءهاضمه

گرفتگی صدا

سدیم والپروات چیست؟

این دارو از دسته داروهای ضد صرع است و یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین داروها در کنترل حملات تشنجی بیماری صرع در افراد مختلف، از کودکان تا بزرگسالان، محسوب می‌شود. علاوه بر این کاربرد اصلی، این دارو در زمینه‌های متنوعی مانند پیشگیری از میگرن، درمان بیماری‌های اعصاب روانی از جمله افسردگی و کاهش دردهای عصبی ناشی از دیابت نیز تجویز می‌شود. تشنج یک حمله عصبی ناشی از اختلال در فعالیت الکتریکی مغز است و سدیم والپروات با کاهش فعالیت‌های الکتریکی غیرطبیعی مغز، حملات تشنجی را کنترل می‌کند.

موارد مصرف والپروات سدیم

صرع

اختلال دوقطبی

میگرنی سردرد

- گاهی اوقات از والپروات سدیم برای درمان سایر اختلالات عصبی مانند اختلال هراس، سندرم پای بی‌قرار و دردهای عصبی ناشی از دیابت استفاده می‌شود.

تداخلات دارویی سدیم والپروات

تداخل با داروهای ضد تشنج: فنی توئین، کاربامازپین، فنوباریتال / لاموتریژین / توپیرامات

تداخلات با داروهای ضد اضطراب: بنزودیازپین ها

تداخل با داروهای رقیق کننده خون: وارفارین

تداخل با داروهای ضد بارداری

آنتی‌بیوتیک‌ها: اریترومايسين / کلاریترومایسین

تداخل با داروهای ضد قارچی: ایتراکونازول، کتوکونازول

تداخل با داروهای ضد ویروسی: لایویریدین، ریتوناویر

تداخلات با داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی: ایبوپروفن، ناپروکسن

تداخل با داروهای مسکن : استامینوفن

عوارض جانبی شایع

مشکلات گوارشی

تهوع: این شایع‌ترین عارضه جانبی سدیم والپروات است و در حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد. تهوع معمولاً خفیف و قابل تحمل است و با گذشت زمان برطرف می‌شود

استفراغ: استفراغ کمتر از تهوع شایع است و در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

اسهال: اسهال در حدود ۳ تا ۵ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

درد معده: درد معده در حدود ۲ تا ۳ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

سوء هاضمه: سوء هاضمه در حدود ۱ تا ۲ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

خواب آلودگی: خواب آلودگی در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد. این عارضه جانبی معمولاً در ابتدای مصرف دارو بیشتر مشهود است و با گذشت زمان برطرف می‌شود

افزایش وزن: افزایش وزن در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

ریزش مو: ریزش مو در حدود ۳ تا ۵ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

لرزش: لرزش در حدود ۲ تا ۳ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

تغییرات خلقی: تغییرات خلقی مانند تحریک پذیری، اضطراب و افسردگی در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

سر درد: سر درد در حدود ۵ تا ۱۰ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

خشکی دهان: خشکی دهان در حدود ۳ تا ۵ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

تورم دست و پا: تورم دست و پا در حدود ۲ تا ۳ درصد از افراد مصرف کننده رخ می‌دهد

گاباپنتین چیست؟

یکی از پرمصرف‌ترین داروهای ضد صرع و تشنج است و در خط اول درمان این بیماری قرار دارد این دارو برای تسکین و کاهش دردهای ناشی از آسیب‌های عصبی یا دردهای نوروپاتیک نیز تجویز می‌شود

عوارض قرص گاباپنتین

پس از مصرف این دارو فرد غالباً احساس **خستگی و خواب‌آلودگی** می‌کند. نمی‌تواند تمرکز کند و برای انجام فعالیت‌های دقیق ذهنی با مشکل مواجه می‌شود. در برخی موارد بیمار از سردردهای شدید پس از مصرف دارو شکایت می‌کند. تغییرات در بینایی مانند تاری دید و دوبینی از دیگر علائم مصرف این دارو است

سایر عوارض گاباپنتین عبارتند از:

- تهوع
- استفراغ
- اسهال
- بی‌خوابی
- آبریزش بینی
- افزایش وزن
- رعشه و لرزش اندام
- کند شدن حرکات در حین راه رفتن
- درد عضلانی
- خارش چشم‌ها
- افکار پریشان
- تب
- آتاکسی
- ضعف حافظه و عدم تمرکز
- ورم دست و پا
- خشکی دهان

تداخلات دارویی

- داروهای مسکن حاوی مواد مخدر از جمله مورفین و ویکودین
- داروهای سوزش معده مانند سایمتیدین، مالوس و میلاننا

داروهای کاهش‌دهنده عوارض قرص گاباپنتین

ارلیستات

میانسرین

نمک‌های منیزیم

آلومینیم هیدروکسید

مفلوکین

داروی سفالکسین چیست؟

سفالکسین نوعی آنتی بیوتیک سفالوسپورینی است که عفونت‌های باکتریایی را درمان می‌کند.

عوارض سفالکسین چیست؟

مصرف سفالکسین ممکن است موجب عوارض زیر شود، اگر هر یک از این عوارض ادامه یابند، با پزشک خود تماس بگیرید.

- حالت تهوع
- اسهال
- درد شکمی
- واکنش‌های حساسیتی مانند کهیر، خارش یا تورم
- سردرد
- خستگی
- سرگیجه
- واکنش‌های پوستی مانند آگزما یا راش
- کاندیدیازیس دهانی یا واژینال
- تغییر در تست‌های کبدی

تداخلات دارویی سفالکسین

متفورمین – ممکن است جذب متفورمین را افزایش دهد.

وارفارین – ممکن است اثرات ضد انعقادی وارفارین را تقویت کند.

پروبنسید – می‌تواند باعث افزایش سطح سرمی سفالکسین شود.

لوپ دیورتیک‌ها مانند فوروزماید – احتمال افزایش اثرات نفروتوکسیک.

آمینوگلیکوزیدها مانند ژنتامایسین – ریسک افزایش نفروتوکسیسیتی.

داروهای ضداسید و مکمل‌های حاوی آهن یا کلسیم – ممکن است جذب سفالکسین را کاهش دهند.

موارد احتیاط مصرف سفالکسین چیست؟

چنانچه سابقه‌ی بیماری‌هایی نظیر مشکلات کلیوی و بیماری رودهای کولیت دارید، حتما این موارد را با پزشک خود در میان بگذارید.

شربت خوراکی این دارو ممکن است حاوی شکر باشد لذا اگر دیابت دارید در مصرف شربت سفالکسین دقت کنید و با پزشک خود مشورت کنید.

مصرف سفالکسین ممکن است موجب مشکلات در واکنش‌های باکتریایی مانند واکنش تیفوئید شود. در هنگام مصرف این دارو واکسیناسیون را، به جز مواردی که پزشک توصیه کرده است، انجام ندهید.

داروی مترونیدازول

داروی مترونیدازول آنتی بیوتیکی است که با باکتری‌ها مقابله می‌کند و برای درمان انواع مختلف عفونت‌ها استفاده می‌شود.

این دارو دسته‌ای از آنتی بیوتیک‌ها است.

این آنتی بیوتیک فقط عفونت‌های باکتریایی را درمان می‌کند و در درمان عفونت‌های ویروسی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا نقشی ندارد.

داروی مترونیدازول برای درمان عفونت‌های باکتریایی واژن، معده، روده، کبد، پوست، مفاصل، مغز، قلب و دستگاه تنفسی استفاده می‌شود.

عوارض داروی مترونیدازول

- خستگی
- تهوع و استفراغ
- تیره شدن زبان
- زخم دهانی
- کاهش اشتها
- تغییر مزه‌ها در دهان
- احساس طعم فلزی در دهان

موارد منع مصرف داروی مترونیدازول

- بارداری
- شیردهی
- قصد بارداری
- اگر هنگام مصرف باردار شدید
- بیماری‌های کلیوی
- بیماری‌های کبدی
- بیماری‌های گوارشی و روده‌ای مثل بیماری کرون
- اختلالات خونی
- یا اختلالات دستگاه عصبی صرع، تشنج

داکسی سایکلین

قرص داکسی سایکلین یک نوع آنتی‌بیوتیک است که برای درمان عفونت‌های باکتریایی تجویز می‌شود. آنتی‌بیوتیک‌ها اثرات خود را با جلوگیری از رشد و تکثیر باکتری‌ها و از بین بردن آن‌ها نشان می‌دهند.

داروی داکسی سایکلین معمولاً یک یا ۲ بار در روز همراه با یک لیوان آب مصرف می‌شود. بهتر است داکسی سایکلین را با معده خالی مصرف کنید، اما اگر دچار مشکلات گوارشی می‌شوید، می‌توانید آن را با غذا یا شیر بخورید.

عوارض قرص داکسی سایکلین

آنتی‌بیوتیک داکسی سایکلین ممکن است عوارض جانبی ایجاد کند. در صورتی که علائم زیر شدید بودند یا با گذشت زمان از بین نرفتند، به پزشک مراجعه کنید:

- حالت تهوع
- استفراغ
- اسهال
- از دست دادن اشتها
- (خارش رکتوم) (راست روده)
- تورم، قرمزی، سوزش، خارش یا تحریک واژن
- ترشحات واژن
- احساس درد هنگام دفع ادرار
- گلودرد
- تورم زبان
- خشکی دهان
- اضطراب
- کمردرد
- تغییر رنگ پوست، ناخن، چشم یا دهان

تداخلات دارویی قرص داکسی سایکلین

- آنتی‌اسیدها، مکمل‌ها و سایر محصولات حاوی آلومینیوم، کلسیم، آهن، منیزیم یا روی
- باربیتورات‌ها
- قرص‌های ضد بارداری
- بیسموت ساب‌سالسیلات
- کاربامازپین
- متوکسی‌فلوران
- رتینوئیدهای خوراکی مانند آسیترتین و ایزوترتینوئین
- سایر آنتی‌بیوتیک‌ها
- فنی‌توئین
- وارفارین

موارد احتیاط و منع مصرف کپسول داکسی سایکلین

- اگر به داکسی سایکلین، مینوسیکلین، تتراسایکلین یا هر داروی دیگری حساسیت دارید
- سابقه بیماری کبد یا بیماری‌های کلیوی
- آسم یا آلرژی به سولفیت و جراحی معده
- (ابتلا به لوپوس (بیماری که سیستم ایمنی به بافت‌ها و اندام‌ها از جمله پوست، مفاصل، خون و کلیه حمله می‌کند
- فشارخون داخل جمجمه
- عفونت قارچی در دهان یا واژن

قرص مفنامیک اسید چیست؟

مفنامیک اسید یک مسکن ضد التهابی غیر استروئیدی است که برای تسکین درد و کاهش التهاب استفاده می‌شود. بیشترین کاربرد این دارو در درمان درد قاعدگی و دردهای متوسط تا شدید دندان و سر است

عوارض مفنامیک اسید

- دل درد
- حالت تهوع
- استفراغ
- سوزش سردل
- یبوست
- اسهال
- (راش) ایجاد دانه‌های قرمز بر روی پوست
- سرگیجه
- (وزوز گوش) شنیدن صدای زنگ در گوش
- درد قفسه سینه
- تنگی نفس
- ضعف یک طرفه ی بدن
- لکنت زبان
- درد معده یا ناراحتی معده
- مدفوع سیاه و چسبناک
- استفراغ خونی
- زرد شدن پوست یا قسمت سفید چشم

موارد احتیاط مصرف قرص مفنامیک اسید

- در افراد مبتلا به بیماری کبدی، متابولیسم مفنامیک اسید با مشکل مواجه است، که ممکن است منجر به افزایش میزان مفنامیک اسید در خون و ایجاد عوارض جانبی خطرناک شود.
- در افراد مبتلا به بیماری کلیوی، دفع دارو از بدن دچار اختلال است، که در نتیجه منجر به افزایش میزان دارو در بدن و ایجاد عوارض جدی می‌شود.
- مفنامیک اسید ممکن است خطر ابتلا به مشکلات قلبی، از جمله لخته شدن خون، حمله قلبی، سکته مغزی یا نارسایی قلبی را افزایش دهد که می‌تواند کشنده باشد.
- این دارو ممکن است خطر ابتلا به مشکلات معده مانند خونریزی یا زخم معده را افزایش دهد که در هر زمان و بدون هیچ علائم و نشانه‌های هشداردهنده‌ای بروز می‌کنند. احتمال بروز مشکلات شدید معده در افراد بالای ۶۵ سال بیشتر است.

مفنامیک اسید با چه داروهایی تداخل دارد؟

داروهای فشار خون، والزارتان، کندزارتان، لوزارتان، کپتوپریل، لیزینوپریل، لوزارتان، کپتوپریل، لیزینوپریل، آنالپرل، متوپرولول، آنتولول، تیمولول، کلورتالیدون، تورسیماید، بومتانید آپرین، ایبوپروفن، ناپروکسن، سیتالوپرام، فلوکستین، سرتالین داروی اختلال دو قطبی و داروی ضد روماتیسم متوترکسات، آنتی اسید، دیگوکسین

داروی آزیترومايسين چیست؟

آزیترومايسين برای درمان عفونت‌های باکتریایی مانند برونشیت، ذات‌الریه، بیماری‌های مقاربتی و عفونت‌های گوش، ریه، سینوس، گلو و اندام‌های تولید مثلی استفاده می‌شود. همچنین برای درمان یا جلوگیری از بیماری ریه نوعی عفونت ریه که بیشتر افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد نیز کاربرد دارد.

عوارض قرص آزیترومايسين

- حالت تهوع
- استفراغ
- درد شکم
- ضعف
- اسهال

منع مصرف آزیترومايسين

کولیت

طولانی QT سندروم

بیماری‌های کبدی

میاستنی گراویس

تأثیر داروهای مختلف بر غلظت قرص آزیروسين در بدن

آزیترومايسين ممکن است غلظت داروی کلشی سین را افزایش دهد و در نتیجه سمیت ایجاد کند.

- استفاده‌ی همزمان از استاتین‌ها (داروهای کاهنده‌ی چربی خون) و آزیترومايسين ممکن است خطر رابدومیولیز (آسیب و تخریب عضلات اسکلتی) را افزایش دهد.
- مصرف همزمان آنتی‌اسیدها (آلومینیوم و منیزیم) ممکن است غلظت آزیترومايسين را کاهش دهند.
- هیچ مشکلی در مصرف داروهای گیاهی یا مکمل‌ها، همزمان با مصرف آزیترومايسين وجود ندارد.

تداخل دارویی آزیترومايسين با داروهای دیگر

- فلوئیکازون، سالمترول، ایبوپروفن
- آموکسی‌سیلین، آسپرین، آموکسی‌کلاو
- دیفن‌هیدرامین، آمبودارون، پروکائین آمید
- کینیدین، دولوکستین، داکسی‌سایکلین
- فلوئیکازون بینی، سیکلوسپورین، ارگوتامین
- هیدروکسی کلروکین، پرگابالین، گایافنزین، اس امپرازول
- امپرازول، پردنیزون، آلبوترون، مونته‌لوکاست. ضد اسیدهایی که حاوی منیزیم یا آلومینیوم هستند
- سیمبیکورت (بودزوناید/ فورموترون)، استامینوفن
- (اسید اسکوربیک) C سیانوکوبالامین، ویتامین B۱۲ ویتامین
- (کولکالسیفرول)، زاناکس (آلپرازولام) D۳ وارفارین، ویتامین
- رانیتیدین، ستیریزین، آتورواستاتین، دیگوکسین (داروی قلبی)
- کلشی سین (داروی نقرس)، فنی‌توئین (داروی تشنج)

منیزیم هیدروکساید

هیدروکسید منیزیم جزء رایج آنتی اسیدها مانند شیر منیزیا و ملین ها است اسید معده را کاهش می دهد و آب در روده ها را افزایش می دهد که ممکن است حرکات روده را تحریک کند . برای درمان یبوست گاه به گاه، سوء هاضمه، ترش معده و سوزش سر دل استفاده می شود

موارد منع مصرف

هیدروکسید منیزیم در افرادی که درد معده، تهوع یا استفراغ دارند مصرف دارد

همچنین در افرادی که بیماری التهابی روده، انسداد روده یا اختلال عملکرد کلیه دارند، منع مصرف دارد ●

عوارض جانبی منیزیم هیدروکساید

اسهال

کاهش حس چشایی ●

(علائم سطوح بالای منیزیم) مانند ضعف عضلانی، ضربان قلب آهسته/نامنظم، تنفس آهسته یا کم عمق، گیجی یا کما ●

حالت تهوع، استفراغ یا اسهال شدید ●

عدم اجابت مزاج پس از مصرف دارو به عنوان ملین ●

خونریزی از رکتوم ●

بدتر شدن علائم ●

تداخلات دارویی

ایبا، وارفارین، لیزینوپریل، لووتیروکسین، گاباپنتین، دیگوکسین سایمتیدین، ایبوپروفن، آلدرونیت، آتورواستاتین سدیم ریسدرونات ندرونات

هشدارها

اگر معده درد، تهوع یا استفراغ دارید، بدون تجویز پزشک از هیدروکسید منیزیم استفاده نکنید

اگر پس از استفاده از دارو به عنوان ملین، دچار خونریزی مقعدی یا بدتر شدن علائم، حالت تهوع، استفراغ یا اسهال شدید و مدفوع تان نیامد، مصرف هیدروکسید منیزیم را متوقف کنید و بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید

از هیدروکسید منیزیم برای بیش از ۷ روز بدون توصیه پزشکی استفاده نکنید

قرص هماتینیک برای چیست؟

کپسول هماتینیک یک محصول با کیفیت است که در درمان انواع کم خونی مثل کم خونی (آمی) پرنیشوس و کم خونی مگالوبلاستیک بسیار موثر است. یکی از کاربردهای مهم قرص هماتینیک، درمان کم خونی متأثر از فقر آهن در دوران بارداری، نوزادی و کودکی می‌باشد.

C ویتامین

اما این C این ویتامین برای جذب بهتر آهن در قرص هماتینیک به کار رفته است. بیشتر ما فقط هنگام سرماخوردگی به سراغ ویتامین می‌رویم؛ ویتامین خواص دیگری هم برای بدن دارد. کمک به جذب بهتر آهن در روده، کاهش عوارض گوارشی قرص آهن، تولید کلاژن و کراتین در پوست و موها، تقویت سیستم ایمنی، خاصیت آنتی اکسیدان بالا و... همگی از خواص این ویتامین هستند.

موارد منع مصرف

در دو ماه اول دوران بارداری، فقط در صورت ضرورت و با احتیاط فراوان به شرط آن که فواید مصرف دارو بر آثار سوء احتمالی آن برتری داشته باشند، مصرف گردد و در ۷ ماه آخر دوران بارداری مصرف آن بی خطر است و منعی ندارد.

عوارض جانبی

مصرف هماتینیک ممکن است باعث بروز عوارض گوارشی شود که می‌توان آن را کنترل کرد. با مصرف دوز متوسط از این کپسول در افراد حساس و یا دوز بالا در افراد عادی، احتمال بروز عوارضی همچون راش پوستی، تهوع، استفراغ، گرگرفتگی صورت و اسهال وجود دارد. معمولاً در اثر استفاده از فرآورده های حاوی آهن، رنگ مدفوع به سبزه تیره یا سیاهی می‌گراید که دلیل این موضوع، کاهش جذب آهن می باشد و بی خطر است.

تداخل دارویی

چنانچه دارای سابقه حساسیت به فرآورده های حاوی آهن، فولیک اسید و یا هر نوع ماده و غذای رنگی دارید، باید پیش از مصرف کپسول و قرص هماتینیک با پزشک مشورت نمایید. اگر دچار بیماری هایی همچون آلرژی، آسم، مشکلات کبدی، عفونت های شدید کلیوی، التهاب روده، کولیت، زخم معده، التهاب روده، التهاب مجاری گوارشی، الکلیسم و آرتریت روماتوئید هستید، مشورت با پزشک قبل از مصرف داروی هماتینیک ضروری است.

.. آنتاگونیست های فولیک اسید مثل متوترکسات، پانکراتین و فلوروکینولون ها

در نهایت در صورت استفاده از برخی داروهای خاص دیگر نیز باید برای مصرف کپسول هماتینیک با پزشک مشورت کنید، این داروها عبارتند از: آنتی اسیدها، پنی سیلین، تتراسایکلین ها

فروس سولفات چیست؟

نوعی مکمل غذایی حاوی فروس (آهن) است که به عنوان منبع متعادل آهن برای بدن عمل می‌کند. آهن عنصر مهمی برای ساخت هموگلوبین در خون است که

نقش حیاتی در انتقال اکسیژن به انواع بافت‌های بدن ایفا می‌کند

بهترین زمان مصرف قرص فروس سولفات

بهترین زمان مصرف این دارو به دستور پزشک و شرایط فرد بستگی دارد. بهترین زمان مصرف آن با معده خالی ترجیحاً نیم ساعت قبل غذا یا دو ساعت بعد از غذا باشد. در صورتی که مصرف با معده خالی باعث ناراحتی معده شود می‌توان قرص را همراه وعده غذایی یا بعد از آن همراه آب پرتقال، یا مکمل ویتامین ث مصرف کرد

عوارض قرص فروس سولفات

- تهوع و استفراغ
- تغییر در رنگ مدفوع
- تیرگی دندان‌ها
- تهوع و عوارض گوارشی

موارد احتیاط و منع مصرف فروس سولفات

- در صورتی که به فروس سولفات یا دیگر ترکیبات موجود در قرص حساسیت دارید، باید از مصرف آن خودداری کنید
- اگر مشکلات معده، روده یا کبد دارید قبل مصرف حتماً باید با پزشک مشورت کنید
- در صورتی که از عفونت معده رنج ببرید، اثربخشی فروس سولفات کاهش می‌یابد

موارد منع مصرف فروس سولفات عبارتند از:

- کمبود آهن ناشی از علل غیرکمبود آهنی مانند تنفسی بالا، تغذیه نامناسب یا جراحی
- آنمیا ناشی از علل غیرکمبود آهن

تداخلات دارویی فروس سولفات

- مصرف همزمان با مکمل‌های آهن
- (مصرف همزمان این دارو با آنتاسیدها (مانند آنتاسید) و مهارکننده‌های پمپ پروتون (مثل امپرازول
- (همزمان با تتراسیکلین‌ها (مانند دوکسی‌سایکلین
- (همزمان با آکالوئیدها (مانند کلرامین

سفکسیم چیست

داروی سفیکسیم یا سفکسیم نوعی آنتی‌بیوتیک است که به خانوادگی آنتی‌بیوتیک‌های سفالوسپورین تعلق دارد و باکتری‌ها را هدف قرار می‌دهد.

عوارض جانبی سفکسیم چیست؟

- درد شکم
- اسهال
- ضعف
- تهوع
- نفخ
- سردرد

موارد احتیاط مصرف سفکسیم چیست؟

قبل از مصرف اگر به داروی سفکسیم، پنی‌سیلین و یا آنتی‌بیوتیک‌های سفالوسپورین مانند قرص سفالکسین استفاده می‌کنید حساسیت دارید به پزشک اطلاع دهید ،

- مشکلات کلیوی
- بیماری روده‌ای کولیت

تداخلات دارویی سفکسیم

رقیق‌کننده‌های خون مانند وارفارین می‌توانند با سفیکسیم تداخل دارویی داشته باشند

داروی پنتوپرازول چیست؟

پنتوپرازول دارویی است که برای درمان برخی از مشکلات معده و مری تجویز می‌شود. این دارو میزان اسید معده را کاهش داده و از این طریق علائم مربوط به بیماری‌های معده را بهبود می‌بخشد. پنتاپرازول در دسته داروهایی به نام مهارکننده‌های پمپ پروتئین قرار دارد. این دارو به‌صورت قرص، سوسپانسیون خوراکی و داخل وریدی تجویز می‌شود.

عوارض پنتوپرازول چیست؟

- سردرد
- اسهال
- دل‌درد
- حالت تهوع و استفراغ
- باد شکم
- سرگیجه
- درد مفاصل
- شکستگی استخوان
- لوپوس اریتماتوز جلدی که باعث که باعث ایجاد بثورات روی پوست می‌شود
- لوپوس اریتماتوز سیستمیک که باعث خستگی، کاهش وزن، لخته شدن خون، سوزش سردل و تب می‌شود
- پولیپ غده فوندیک

موارد احتیاط

- واکنش آلرژیک: در موارد نادر می‌تواند باعث آلرژی شود و تورم پوست و مشکلات تنفسی ایجاد کند
- اگر پوکی‌استخوان دارید، با پزشک در میان بگذارید. این دارو خطر ابتلا به پوکی‌استخوان را افزایش می‌دهد
- اگر سابقه هیپو منیزمی (پایین بودن سطح منیزیم خون) دارید، این دارو می‌تواند منیزیم خون شما را کاهش دهد
- مصرف این دارو روی نتایج آزمایش مربوط به تومورهای عصبی غدد تأثیر گذاشته و مصرف آن باید ۱۴ روز قبل از آزمایش قطع شود
- مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی باید قطع شود
- اگر از داروهای حاوی ریلپیویرین استفاده می‌کنید، باید به پزشک اطلاع دهید

تداخلات دارویی پنتاپرازول

○

○ داکسی‌سایکلین

- کتوکونازول
- آمپی‌سیلین
- کتوکونازول
- آمپی‌سیلین

ز

برای کاهش درد، تورم (التهاب) و سفتی مفاصل ناشی از آرتریت استفاده می‌شود. کاهش این علائم به شما کمک می‌کند تا دوباره بتوانید فعالیت‌های عادی روزانه خود را انجام دهید. در واقع این داروی ضد التهابی غیر استروئیدی با مسدود کردن تولید برخی از مواد طبیعی در بدن که باعث التهاب می‌شوند، عمل می‌کند. این اثر به کاهش تورم، درد یا تب کمک می‌کند

ایا شیاف دیکلوفناک باید در یخچال نگهداری شود؟

داروهای هورمونی فقط در یخچال نگهداری می‌شوند. سایر داروها را در دمای زیر ۲۵ درجه نگهدارید

عوارض جانبی و مضرات دیکلوفناک چه مواردی است؟

○ ناراحتی گوارشی از مضرات دیکلوفناک

○ حالت تهوع

○ سوزش سر دل

○ اسهال

○ یبوست

○ نفخ

○ سردرد

○ گیجی

○ خواب‌آلودگی که منجر به گیجی شود

موارد احتیاط مصرف داروی دیکلوفناک چیست؟

○ خونریزی یا مشکلات انعقادی

○ (مشکلات قلبی (از قبیل حمله قلبی

○ فشار خون بالا

○ بیماری‌های کبدی

○ پولیپ بینی

○ (بیماری‌های معده، روده، مری (مانند خونریزی، زخم‌ها، سوزش مکرر سر دل

○ آسم

تداخلات دارویی داروی دیکلوفناک

○ آلیسکرین

○ (بعضی از انواع داروهای فشارخون (مانند کاپتوپریل، لیزینوپریل، والسارتان، لوزارتان

○ (کورتیکواستروئید (مانند پردنیزولون

○ سیدوفوئیر

○ لیتیموم

○ متوترکسات

○ داروهای ادرار آور (مانند فوروزماید)

کلیندامایسین چیست

داروی کلیندامایسین یک آنتی بیوتیک است که برای درمان عفونت‌های مختلف، به ویژه عفونت‌های باکتریایی مانند عفونت پوستی، تنفسی و دندان‌داری کاربرد دارد.

عوارض جانبی کلیندامایسین چیست؟

مصرف کلیندامایسین ممکن است موجب عوارضی مانند استفراغ، تهوع، و اسهال شود. اگر هر یک از این عوارض ادامه پیدا کرد، با پزشک خود تماس بگیرید. استفاده مکرر این دارو در دوره‌های طولانی ممکن است موجب ترشحات دهانی و ..ترشحات غیرطبیعی واژن شود. در صورت ایجاد این عوارض یا عوارضی دیگر با پزشک خود تماس بگیرید.

موارد احتیاط مصرف کلیندامایسین

قبل از مصرف اگر به داروی کلیندامایسین و لینکومایسین حساسیت دارد و یا حساسیت دیگری دارید، این موضوع را با پزشک اطلاع دهید.

قبل از مصرف این دارو سوابق پزشکی خود مخصوصاً بیماری‌های کبدی، بیماری‌های کلیوی، بیماری روده‌ای مانند کولیت و کلستریدیوم دیفیسیل با نشانه اسهال شدید، حساسیت مانند آسم، آگزما و تب یونجه را با پزشک خود در میان ..بگذارید.

تداخلات دارویی کلیندامایسین

- آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید مانند کلاریترومایسین و اریترومایسین
- کوالین پکتین

ایبوپروفن چیست؟ (شربت ایبوپروفن یا قرص بروفن)

ایبوپروفن نوعی داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی است. این دارو برای کاهش تب و کاهش درد بدن ناشی از سرماخوردگی و آنفولانزا، سردرد، درد دندان، دل‌درد قاعدگی، دردهای عضلانی یا التهاب مفاصل کاربرد دارد.

عوارض ایبوپروفن چیست؟

- ناراحتی معده
- حالت تهوع
- استفراغ
- سردرد
- اسهال
- یبوست
- سرگیجه
- خواب‌آلودگی

موارد احتیاط مصرف ایبوپروفن

- تنگی نفس و وخیم‌تر شدن آن بعد از مصرف آسپرین و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی
- اختلالات خونی مانند کم‌خونی، خونریزی یا لخته شدن خون
- پولیپ بینی
- عارضه ایبوپروفن برای بیماران قلبی مانند سابقه‌ی حمله‌ی قلبی
- فشار خون بالا
- بیماری‌های کبدی
- سابقه‌ی سکته‌ی مغزی
- مشکلات معده و روده مانند خونریزی و سوزش یا زخم معده دارید،
- اگر دچار دهیدراتاسیون یا کم‌آبی بدن، نارسایی قلبی یا بیماری‌های کلیوی هستید یا در صورتی‌که سال‌خورده‌اید یا داروهای خاصی مصرف می‌کنید

تداخلات دارویی ایبوپروفن

- آلیسکیرن
- بازدارنده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین مانند کاپتوپریل و لیزینوپریل
- مانند لوزارتان و والزارتان II آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین
- سیدوفوویر
- کورتیکواستروئید مانند پردنیزولون
- لیتیم
- تداخل ایبوپروفن با الکل
- قرص‌های آب و ادرار آورهای مانند فوروزماید

شربت فارمنتین

شربت فارمنتین یک داروی آنتی بیوتیک ترکیبی است که حاوی دو ماده فعال است : آموکسی سیلین و اسید کلاوولانیک (کوآموکسی کلاو)

عوارض جانبی شربت فارمنتین

اسهال

تهوع و استفراغ

درد یا ناراحتی شکم

بثورات پوستی یا خارش

سردرد

تغییر در حس چشایی

موارد منع مصرف

حساسیت مفرط شناخته شده به آموکسی سیلین، اسید کلاوولانیک یا سایر آنتی بیوتیک های پنی سیلین

(واکنش های آلرژیک شدید قبلی (مانند آنافیلاکسی) به آنتی بیوتیک های بتالاکتام (مانند پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها

یا مشکلات کبدی مرتبط با مصرف کوآموکسی کلاو سابقه زردی ●

مونونوکلئوز عفونی (عفونت ویروسی)، زیرا کوآموکسی کلاو ممکن است باعث ایجاد بثورات در این افراد شود ●

تداخل دارویی شربت فارمنتین

داروهای ضد انعقاد خون (وارفارين)

داروهای ضد بارداری خوراکی ●

منوترکسات ●

آلوپورینول ●

پروبیوتیک ها ●

داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی ●

اسپری سالبوتامول چیست؟

مانند آسم استفاده می‌شود و به اسپری سالبوتامول نوعی داروی برونش‌گشا است که برای درمان بیماری‌های ریوی و بهبود علائم مشکل ریه عنوان یک آگونیست بتا-۲ آدرنرژیک عمل می‌کند، به این معنی که به گیرنده‌های بتا-۲ در راه‌های هوایی متصل شده و باعث تقویت عضلات و صاف عروق خونی، مسدود کردن عضلات صاف راه‌های هوایی و در نهایت باز شدن مجدد راه‌های هوایی می‌شود و علائم آسم در بزرگسالان (تنگی نفس نشانه چیست؟)، خس خس صدا در سینه و سرفه را کاهش می‌دهد. اسپری سالبوتامول به صورت کودکان مانند سختی در تنفس استنشاقی در موارد اضطراری برای تسکین سریع علائم آسم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوارض اسپری سالبوتامول

لرزش

تپش قلب

عصبانیت یا اضطراب

درد عضلانی

دیسکوآرد یا اختلال خواب

عوارض اسپری سالبوتامول برای کودکان

در موارد دوز درمانی شدید مصرف این اسپری ممکن است باعث ایجاد عوارضی مانند تاکی کاردی، لرزش و هیپوکالمی شود. در صورت استفاده بیش از حد از دوز مجاز هم احتمال افزایش قند خون، اسیدوز لاکتیک و آریتمی قلبی بالاتر می‌رود.

موارد احتیاط و منع مصرف اسپری سالبوتامول

○ آلرژی و حساسیت

○ بیماری‌های قلبی مانند آریتمی قلبی، نارسایی قلبی یا انسداد مزمن راه‌های هوایی

○ بیماری‌های تیروئید

منع مصرف:

○ حساسیت شدید به سالبوتامول

○ بیماری‌های حاد ریه‌ای مانند آسم شدید و مزمن

○ بیماری مزمن انسدادی ریوی

تداخلات دارویی اسپری سالبوتامول

○ مصرف همزمان این دارو و بتابلاکرها مانند پروپرانولول باعث کاهش اثر موثر اسپری و افزایش خطر ایجاد تنگی نفس می‌شود.

○ داروهای ضدافسردگی مانند مهارکننده‌های بازجذب سروتونین و نوراپی نفرین باعث افزایش خطر بالا رفتن ضربان قلب و اثرات جانبی قلبی می‌گردد.

○ استفاده همزمان از دیگوکسین و سالبوتامول باعث افزایش خطر عوارض قلبی مانند آریتمی می‌شود.

○ برخی دیورتیک‌ها مانند فورزامید با سالبوتامول تداخل دارند و سطح پتاسیم خون را افزایش می‌دهند.

اسپری بکلومتازون یا داروی بکلومتازون چیست؟

بکلومتازون برای جلوگیری و کنترل عوارضی که ناشی از بیماری آسم می‌شود، مانند خس خس کردن سینه و تنگی نفس به‌کار می‌رود. این دارو در دسته داروهای کورتیکواستروئید طبقه‌بندی می‌شود. نام تجاری بکلومتازون، اسپری استنشاقی بکلومتازون است.

عوارض اسپری بکلکس بکلومتازون چیست؟

- سرفه‌های شدید
- تنگی نفس با اسپری بکلکس ۲۵۰
- خس خس سینه
- افزایش خلط از عوارض دی بی نازال کورت
- بیدار شدن از خواب با مشکلات تنفسی
- استفاده زیاد از اسپری‌های عملکرد سریع (بیش از ۲ روز در هفته)

تداخلات دارویی اسپری استنشاقی بکلومتازون با داروهای دیگر

- آلدسولکین
- میفپریستون
- دزموپرسین
- ماسیمورلین
- نادرپارین
- سارگراموستیم
- فنیل بوتیرات

عوارض خطرناک اسپری بینی یا اسپری دهانی بکلومتازون

واکنش آلرژیک بالا از نادرترین عوارض اسپری بینی بکلومتازون است. با این حال اگر هریک از علائمی مانند بیهوشی، خارش یا تورم (به‌خصوص در صورت، زبان و گلو)، سرگیجه شدید و مشکلات تنفسی را تجربه کردید، سریعاً از فوریت‌های پزشکی کمک بگیرید. با توجه به اینکه لیست عوارض کامل نیست، ممکن است با عارضه‌ای برخورد کنید که ذکر نشده‌باشد.

اسپری بینی سدیم کلراید ۶۵٪ دی بی سالین

اسپری بینی سدیم کلراید ۶۵٪ دی بی سالین برای شستشوی سینوس ها و حفظ رطوبت ترشحات بینی و کاهش خشکی و التهاب غشاء بینی در سرماخوردگی ها، پایین بودن میزان رطوبت، مصرف بیش از حد ضداحتقان ها، آلرژی ها، خونریزی های خفیف بینی، خشکی زمستانی، مسافرت های هوایی، بارداری، اکسیژن درمانی، سینوزیت مزمن، جراحی یا آندوسکوپی سینوس ها از طریق بینی و سایر تحریکات بکار می رود

موارد منع مصرف

کلرید سدیم بینی به طور کلی برای اکثر افراد بی خطر در نظر گرفته می شود

- با این حال، در صورت داشتن حساسیت یا آلرژی شناخته شده به کلرید سدیم یا سایر اجزای اسپری بینی، منع مصرف دارد
- اگر علائم واکنش آلرژیک مانند مشکل در تنفس، بثورات پوستی یا تورم را تجربه کردید، مصرف را قطع کرده و به دنبال مراقبت های پزشکی باشید

عوارض جانبی سدیم کلراید بینی

سوزش یا سوزش موقت در مجرای بینی

- خشکی یا تحریک مجاری بینی
- عطسه یا افزایش ترشحات بینی (موقت)

روش مصرف

- با فشردن بدنه بطری این فرآورده محتویات آن بصورت اسپری خارج می شود. در اولین مصرف لازم است بدنه برای چند بار فشرده شود تا عمل اسپری انجام گیرد
- برای استفاده، دهانه اسپری را بدون ایجاد تماس به حفره بینی خود نزدیک نمایید و در حالی که هوا را بدرون بینی خود وارد می نمایید، عمل اسپری نمودن محلول را انجام دهید
- پس از اسپری شدن دارو در بینی چندبار و بطور عمیق هوا را بدرون بینی خود بکشید تا مطمئن شوید دارو بطور عمقی وارد بینی شده است

مومتازون

داروی مومتازون در چند شکل اسپری بینی، پماد، کرم و لوسیون موجود می باشد. اسپری بینی مومتازون است. این اسپری جهت آرام بخشی رینیت (بیماری التهاب بینی) مورد استفاده قرار میگیرد

موارد منع مصرف مومتازون

بدون تجویز پزشک مومتازون را مصرف نکنید. مصرف خودسرانه می تواند به جنین یا خود در دوران بارداری یا شیردهی شما آسیب بزند.

قبل از انجام اعمال نیازمند به هوشیاری مانند رانندگی، از پایدار بودن وضعیت تمرکز و هوشیاری خود اطمینان حاصل نمایید.

عوارض مصرف مومتازون

سوزش در بینی

خونریزی جزئی از بینی –

درد در ناحیه گلو یا سر –

تداخلات دارویی مومتازون

تداخلات ماژور: بمپیارین، کویبسیستات، ماسیمورلین، نادرپارین، نیرماترلویر، ریتوناویر، سارگراموستیم 1.

تداخلات متوسط: آتازاناویر، آرانوفین، کلاریترومایسین، گلیسرول فنیل بوتیرات، ایندیناویر، انسولین(انواع)، 2.

کتوکونازول، نفازودون، نلفیناویر، ساکوئیناویر، تلپترومایسین، تستوسترون(انواع)

افزایش اثر داروها توسط مومتازون: دسموپرسین، لوگزامپین 3.

کاهش اثرات داروها توسط مومتازون: آلدسلوکین، کوزینتروپین، اسکتامین(نازال) 4.

قرص فنوباربیتال چیست؟

قرص فنوباربیتال داروی باربیتورات است که کاربردهای مختلفی دارد و بیشتر به عنوان داروی ضد صرع برای کنترل و پیشگیری و کودکان را کاهش می‌دهد. از تشنج و برخی اختلالات عصبی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو [علائم صرع در بزرگسالان](#) فنوباربیتال با تأثیر بر مغز و سیستم عصبی مرکزی، از طریق مهار عملکرد سلول‌های عصبی مرتبط با تشنج‌ها به درمان تهوع و تشنج کمک می‌کند.

همچنین، این دارو می‌تواند به عنوان مهارکننده اعصاب و ضد اضطراب نیز عمل می‌کند. فنوباربیتال در برخی موارد دیگر از جمله درمان بی‌خوابی، تشنج‌های تنبیهی در اپیله‌سی رفتاری، تشنج‌های حمله‌ای در میگرن و درمان بعضی اختلالات خواب مانند اختلال **قرص فنوباربیتال برای زردی نوزاد کاربرد دارد؟**

قرص فنوباربیتال برای درمان تشنج و برخی اختلالات روانی استفاده می‌شود و مصرف آن برای درمان زردی نوزادان توصیه نمی‌شود. زردی نوزادان ناشی از انبساط ناقص سیستم کبدی است که به طور طبیعی در ایام اولیه پس از تولد رخ می‌دهد. اغلب موارد زردی نوزادان به‌طور خود به خودی بهبود می‌یابد و نیاز به درمان دارویی ندارد. در صورت لزوم، روش‌های دیگری مانند کار درمانی نوری (فتوتراپی) یا در صورت موارد خاص، درمان دارویی مناسب تجویز می‌شود.

خواب در کودکان نیز استفاده می‌شود

عوارض جانبی قرص فنوباربیتال

- خواب آلودگی و کاهش تمرکز
- خشکی دهان
- سردرد
- گیجی و سرگیجه
- تهوع و استفراغ
- افزایش اشتها و وزن
- تحریک و بیقراری
- تغییرات خلقی و روانی از جمله افسردگی و اضطراب
- افزایش حساسیت به نور
- مشکلات خواب و بیداری

منع مصرف و موارد احتیاط

- سابقه حساسیت شدید به فنوباربیتال یا داروهای مشابه
- بیماری کبدی مزمن
- مشکلات کلیوی
- بیماری‌های قلبی مانند بیماری عروق کرونر، نارسایی قلبی و ضربان قلب نامنظم
- بارداری و شیردهی
- تداخل با داروهای دیگر

تداخلات دارویی فنوباربیتال

- داروهای ضد تشنجی مانند فنی‌توئین و کاربامازپین: باعث کاهش اثربخشی داروهای ضد تشنجی می‌شود
- برخی داروهای ضد افسردگی مانند سرتالین و فلوکستین: باعث افزایش غلظت داروهای ضد افسردگی در بدن می‌شود
- داروهای ضد انعقاد (آنتی‌کوآگولانت‌ها) مانند وارفارین: باعث افزایش خطر خونریزی یا کاهش خون انعقادی می‌شود
- مصرف همزمان با الکل می‌تواند اثرات سیستم عصبی مرکزی را افزایش دهد و عوارضی مانند خواب آلودگی، تنگی نفس و افت فشار خون را تشدید کند
- داروهای ضدصرعی مانند فالپروئیک اسید: باعث کاهش اثربخشی داروهای ضدصرعی می‌شود

ساشه (پودر) اس امپرازول

به عنوان مهارکننده پمپ پروتون شناخته می‌شود که به طور مشابه در درمان بیماری‌های زخم معده و

ریفلاکس معده-مری کاربرد دارد

موارد منع مصرف

عفونت های قارچی کمبود ویتامین ب۱۲ / لوپوس اریتماتوس / پوکی استخوان

عوارض جانبی

مشکلات پوستی پف کردن پلک ها صورت و لبها، تب سرفه، اشکال در بلع گچی ضربان قلب سریع،

درد مفاصل یا ماهیچه ها کاهش اشتها، درد معده و پشت تنگی نفس، زردی پوست و چشم ها ضعف و

خستگی غیر معمول و اسهال و استفراغ

تداخلات دارویی

آتاناناویر، کلپیدوگرل، کتوکونازول، ایتراکونازول و وریکونازول، ارلوتینیب، دیازپام، سیتالوپرا، ایمی

پرامین و کلومی پرامین، فنی تویین، وارفارین یا کومارین، سیلواستازول، سیزاپراید، دیگوکسین،

متوترکسات، تاکرولیموس، ریفامپیسین

دiazepam چیست؟

محسوب می‌شود، می‌تواند Diazepam دارویی است که معمولاً برای درمان اضطراب استفاده دارد. این دارو که از قرص های خواب آور اضطراب جدی و عوارض ناشی از آن مانند بی‌خوابی را بهبود ببخشد. همچنین برای شل شدن عضلات و درمان اسپاسم عضلانی ناشی از آسیب یا شرایطی مانند فلج مغزی و تشنج هم استفاده دارد. بعضی پزشکان قرص Diazepam را برای درمان علائم ترک الکل مانند لرزش و سردرگمی هم تجویز می‌کنند

عوارض Diazepam چیست؟

- تار شدن دید
- آشفته‌گی
- توهّم
- بی‌قراری
- افسردگی
- مشکل در صحبت کردن
- مشکل در راه رفتن
- مشکل در ادرار کردن
- زرد شدن رنگ چشم و پوست
- علائم عفونت مانند گلودرد مداوم و تب و لرز

تداخلات دارویی قرص و آمپول Diazepam

- آزلاستین (نازال)
- برومپریدول
- کانپوآپتان
- فکسینیدازول
- فوسیدیک اسید
- ایدلالیسیب
- مترونیدازول
- متوتری‌مپرازین
- الانزاپین
- اورفنادرین
- اوکسوممازین
- پارالدهید
- سدیم اکسیبات
- تالیدومید

این دارو باعث خواب آلودگی می‌گردد.

قطره پدی لاکت

قطره پدی لاکت زیست تخمیر یک ترکیب ویژه پروبیوتیکی است که اسهال ناشی از ویروس یا باکتری در کودکان اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک فح و کولیک کودکان از موارد تجویز پدی لاکت هستند.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلا به پانکراتیت حاد یا سابقه حساسیت به هر یک از اجزای فرآورده از مصرف آن خودداری نمایید

عوارض جانبی

پروبیوتیک‌ها به طور طبیعی بدن وجود دارند. به همین جهت عموماً بی خطر هستند و به خوبی تحمل می‌شوند. در صورت مشاهده واکنش‌های حساسیتی مانند راش پوستی، خارش، سرگیجه، سرفه و سایر مشکلات تنفسی، پزشک یا داروساز را مطلع فرمایید

تداخل دارویی

بطور کلی مصرف این فرآورده با هیچ دارویی تداخل ندارد. توصیه می‌شود حداقل با دو ساعت فاصله از آنتی بیوتیک‌های خوراکی مصرف شود

در افرادی که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند با احتیاط استفاده شود

کیدی لاکت چیست ؟

کیدی لاکت یک ترکیب ویژه پروبیوتیک و پری بیوتیک برای کودکان بالای دو سال است که حاوی مقادیر بالایی از هفت سویه باکتری سودمند از جمله سویه خاص کودکان (بیفیدوباکتریوم) اینفنتیس به همراه پری بیوتیک فروکتو الیگوساکارید کمک کننده به رشد و فعالیت پروبیوتیک ها میباشد و فرمول آن ویژه کودکان تهیه شده تا آن را به آسانی مصرف کنند

روش و مقدار مصرف کیدی لاکت

طبق دستور پزشک و یا روزانه یک الی ۲ ساشه با آب، آبمیوه، شیر یا غذای کودک مخلوط کرده و بلافاصله مصرف شود. (آب یا غذا نباید خیلی گرم باشد)

عوارض جانبی کیدی لاکت

تاکنون هیچ عارضه خاص و مورد سمیت برای پروبیوتیک ها گزارش نشده است همه پروبیوتیک ها به طور طبیعی در بدن وجود دارند در صورت مشاهده واکنش های حساسیتی مانند راش، خارش، سرگیجه، سرفه و سایر مشکلات تنفسی پزشک یا داروساز را مطلع نمایید

موارد احتیاط و منع مصرف کیدی لاکت

هیچ مورد منع مصرف مطلق برای این فرآورده وجود ندارد، در مواردی مانند نقص سیستم ایمنی، سندروم روده کوتاه، ریسک ایسکمی مزانتر و مصرف داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی با داروهای شیمی درمانی، تجویز پروبیوتیک ها باید با احتیاط بیشتر صورت گیرد

تداخل دارویی کیدی لاکت

به طور کلی مصرف این فرآورده با هیچ دارویی تداخل ندارد. توصیه می شود حداقل با ۲ الی ۴ ساعت فاصله از آنتی بیوتیک های خوراکی مصرف شود.

پودر سابولار برای کودکان

بروز اسهال در کودکان دارای علل مختلفی می باشد که می تواند به دلیل مسافرت، مصرف آنتی بیوتیک ها و یا به دلایل عفونی رخ دهد. در چنین شرایطی بدن فرد میزان قابل توجهی آب از دست داده و ضروری است تا با اقدام سریع برای درمان اسهال، مانع از بروز مشکلات ثانویه برای فرد شد. سابولار پودر در کودکان بالای ۲ سال کاربرد دارد

هشدار و عوارض جانبی ساشه سابولار

1. این محصول ممکن است باعث افزایش گاز معده یا نفخ گردد.
2. اسهال شدید بیش از دو روز (مخصوصاً به همراه تب بالا یا خون در مدفوع)، تضعیف شدید با پزشک یا داروساز مشورت کنید.
3. آلرژیک به این محصول نادر است. اما اگر متوجه یکی از علائم خارش و تورم (به خصوص صورت، زبان، گلو)، سرگیجه شدید، مشکل تنفسی فوراً به پزشک مراجعه کنید
4. ضعیف شدید سیستم ایمنی (از جمله به علت شیمی درمانی و پرتو درمان) عفونت مکرر واژینال، عفونت های شدید مجاری ادراری. در صورتیکه بعد از سه روز از مصرف کیپسول سابولار علائم بیماری شما کم نشد و یا شدیدتر شد، مصرف دارو را قطع کرده و با پزشک خود مشورت نمایید
5. به طور کلی مصرف پروبیوتیک ها در دوران بارداری و شیردهی ایمن است، ولی ایمنی مصرف ساشه سابولار در دوران بارداری و شیردهی ثابت نشده است، بنابراین از مصرف آن در این دوران خودداری نمایید

تداخل دارویی

- سابولار پودر با هیچ ماده غذایی تداخل خاصی ندارد.
 - داروهای ضد قارچ خوراکی مانند کتوکونازول، گریزفولوین و نیستاتین، اثرات ساکاروماسیس بولاردی را کاهش میدهند.
- بنابراین توصیه می شود که ساشه سابولار با این گروه از داروها همزمان استفاده نشود

محلول او ار اس چیست؟

زمانی که بدن آب بیشتری نسبت به میزان آب دریافتی از دست بدهد، دچار دهیدراتاسیون یا کم آبی می‌شود. این اتفاق بنا به دلایل مختلفی از جمله اسهال یا استفراغ به وجود می‌آید. اگر کم آبی بدن جبران و درمان نشود، می‌تواند خطرناک باشد، چرا که بدن برای انجام کارهای معمول خود به آب نیاز دارد. درمان دهیدراتاسیون خوراکی، روش مناسب برای رفع کم آبی بدن است که شامل نوشیدن محلول حاوی آب، قند و نمک (الکتrolیت) به خصوص سدیم و پتاسیم می‌شود. به این نوشیدنی، محلول رهایدراتاسیون خوراکی می‌گویند.

هدف این درمان، رفع دهیدراته شدن بدن و تامین میزان مایعات بدن و رفع کم آبی ناشی از اسهال، استفراغ یا سایر مشکلات است. مصرف این محلول برای هر سنی مناسب است و منع مصرف خاصی ندارد؛ یعنی زنان باردار، شیرده، کودکان و سالمندان می‌توانند بدون مشکل آن را مصرف کنند. به علاوه اینکه، او ار اس، تداخل دارویی خاصی هم ندارد.

عوارض جانبی مصرف محلول او ار اس

- واکنش آلرژیک شدید و خارش، جوش و ورم گلو و دهان
- سرگیجه شدید
- تنگی نفس

موارد احتیاط و منع مصرف محلول او ار اس

محلول او ار اس به هیچ وجه برای بیماران کلیوی و افرادی که رژیم محدودیت مایعات دارند توصیه نمی‌شود. این بیماران برای درمان دهیدراتاسیون باید با تجویز پزشک دارو بگیرند. این محلول خوراکی برای افرادی که از کم آبی شدید رنج می‌برند توصیه نمی‌شود و باید آب از دست رفته بدن را با محلول تزریقی جبران کنند.

تداخلات دارویی محلول او ار اس

ترکیبی از نمک، مواد معدنی و قند است که تداخل منفی با داروها یا غذاها ندارد. در مواردی که فرد بیماری زمینه‌ای داشته باشد، ممکن است مانع از جذب مواد محلول شود و عوارض جانبی ایجاد کند. نمک‌های رهایدراتاسیون خوراکی معمولاً عوارضی ندارند و تداخل دارویی ایجاد نمی‌کنند و می‌توانید همزمان با سایر داروها مصرف کنید. از مصرف نوشیدنی‌های گازدار، آب میوه‌های رقیق نشده، چای، قهوه و نوشیدنی‌های ورزشی پرهیز کنید، چرا که میزان قند بالای این نوشیدنی‌ها باعث تشدید کم آبی بدن می‌شود.

داروی استامینوفن چیست؟

استامینوفن یک مسکن رایج و کاهش‌دهنده تب در کودکان و بزرگسالان است. مکانیسم این داروی به این شکل است که با مسدود کردن تولید برخی مواد شیمیایی در بدن که باعث درد و تب می‌شوند، عمل می‌کند. استامینوفن یا تابلنول بدون نسخه در دسترس است و در بسیاری از داروهای سرماخوردگی و آنفولانزا و همچنین در داروهای مسکن تجویزی یافت می‌شود.

از استامینوفن برای درمان دردهای خفیف و متوسط (سردرد، درد دوران قاعدگی، دندان درد، کمردرد، آرتروز، دردهای زمان سرماخوردگی و آنفولانزا) و کاهش تب استفاده می‌شود.

داروی استامینوفن به شکل‌های زیر در دسترس است:

- شیفاف استامینوفن
- شربت استامینوفن
- آمپول استامینوفن
- قطره استامینوفن

عوارض استامینوفن چیست؟

- علائم پوستی
- خارش از عوارض شیفاف استامینوفن ۳۲۵ برای کودکان
- تورم (مخصوصاً در صورت، زبان و گلو)
- گجی شدید
- و اختلال تنفسی را تجربه کردید،

موارد احتیاط مصرف استامینوفن کدامند؟

- اگر به استامینوفن حساسیت دارید پیش از مصرف، مشکل را با پزشکتان یا دکتر داروخانه مطرح کنید
- قبل از استفاده از استامینوفن، سابقه‌ی پزشکی خود را، به ویژه در خصوص بیماری کبد و مصرف منظم دارو و سوء مصرف الکل، با پزشکتان در میان بگذارید
- محصولات مایع، قرص‌های جویدنی و قرص‌های حل‌شونده در مایعات می‌توانند حاوی قند یا اسپارتام باشند
- در صورت ابتلا به دیابت، فنیل کتونوری و شرایط دیگری که نیاز به محدود کردن یا اجتناب از مصرف این مواد در رژیم غذایی شما دارد،
- **تداخلات دارویی استامینوفن با داروهای دیگر**
 - لاموتریزین
 - باربیتورات‌ها
 - کاربامازپین، فوس فنیتوئین
 - فنیتوئین
 - ایزونیاژید
 - لورلاتینیب
 - ایماتینیب
 - پریلوکائین
 - سدیم نیتريت

والزومیکس (والسارتان / آملودیپین)

کاربرد دارد. کاهش فشار خون سبب کاهش ریسک **(فشار خون بالا)** این دارو برای کاهش فشار خون و درمان پرفشاری خون بیماری‌های قلبی عروقی کشنده و غیر کشنده، سکته‌های مغزی و قلبی می‌گردد

تداخل‌های دارویی

داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین و بتابلوکرها – مصرف توأم سه دارو در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی توصیه نمی‌گردد. مصرف همزمان داروی مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین، بتابلوکر و والسارتان با نارسایی قلبی ناخواسته همراه است.

داروهای مدر- اثرات کاهندگی فشار خون ممکن است افزایش یابد. داروهای نگهدارنده پتاسیم، مکمل‌های پتاسیم یا جانشین‌های نمک حاوی پتاسیم – ممکن است مقادیر پتاسیم در خون را افزایش دهند. همچنین در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ممکن است باعث افزایش مقدار کراتینین در خون گردند. نمک‌های لیتیم – مصرف همزمان ممکن است دفع لیتیم را کاهش دهد. پایش مقدار لیتیم در خون ضروری است. نیتروگلیسرین یا سایر نیترات‌ها و داروهای گشاد کننده عروق – مصرف همزمان ممکن است باعث افزایش اثرات ضد فشار خون گردد.

وارفارین – مصرف توأم با والسارتان ممکن است باعث افزایش زمان پروترومبین گردد. داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بخصوص ایندومتاسین – مصرف همزمان ممکن است باعث کاهش اثرات ضد فشار خون آملودیپین گردد.

داروهای ضد تشنج مانند کاربامازپین، فنوباربیتال، فنی توئین و پرمیدون – در مصرف همزمان رعایت احتیاط ضروری است

موارد احتیاط

-در صورت احتمال بارداری، مورد را سریعاً با پزشک خود در میان بگذارید. اگر این دارو در طی دوران بارداری مصرف شود، ممکن است باعث ناهنجاری‌های مادرزادی یا سایر مشکلات در نوزاد گردد

-از مصرف همزمان این دارو با سایر داروها بدون اطلاع پزشک خودداری نمایید. این داروها شامل داروهای بدون نسخه برای کنترل اشتها، آسم، سرماخوردگی‌ها، سرفه، تب یونجه با بیماری‌های سینوس می‌گردند. این داروها ممکن است باعث افزایش فشار خون گردند

- مصرف همزمان این دارو با یک داروی مدر ممکن است باعث بروز گیجی یا منگی گردد. لذا ضمن درمان از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارد خودداری کنید

-در حین مصرف دارو، در صورت بیمار شدن بخصوص اگر با تهوع و استفراغ شدید یا مداوم همراه باشد، پزشک خود را سریعاً مطلع نمایید. در چنین شرایطی ممکن است به علت از دست رفتن مقادیر زیاد آب بدن، فشار خون کاهش یابد

-در صورت انجام تمرینات ورزشی با قرار گرفتن در هوای گرم، ممکن است گیجی، منگی یا سنکوپ بروز نماید. تعریق زیاد می‌تواند باعث از دست رفتن مقادیر زیاد آب بدن و در نتیجه فشار خون پایین گردد

اسپری ایپراتروپیوم بروماید یا آتروونت چیست؟

ایپراتروپیوم بروماید یک داروی گشادکننده مجاری هوایی است که عضلات صاف مجاری تنفسی را منبسط می‌کند و باعث افزایش جریان هوا به آتروونت بیشتر برای تسکین علائم رینوره (آبریزش بینی) مرتبط با رینیت آلرژیک و غیر آلرژیک در ریه‌ها می‌شود. شکل [اسپری بینی](#) بزرگسالان و کودکان بالای ۱۸ سال و اسپری دهان آتروونت برای بهبود تنفس در بیماران مبتلا به آسم یا انسداد ریوی مزمن کاربرد دارد.

عوارض اسپری ایپراتروپیوم بروماید

- علائم سرماخوردگی مانند گلو درد، گرفتگی بینی و عطسه
- احساس درد و گرفتگی در قفسه سینه
- مشکلات سینوس
- کمردرد
- حالت تهوع
- معده درد
- تب و لرز و علائم شبه آنفلانزا
- یبوست
- ضربان قلب سریع

موارد احتیاط و هشدارها در مصرف آتروونت

قبل از مصرف ایپراتروپیوم بروماید اگر به این دارو یا سایر داروهای تنفسی دیگر حساسیت دارید، به پزشک متخصص اطلاع دهید. مصرف این دارو برای افراد با سابقه مشکلات چشمی مانند گلکوم، مشکلات پروستات و مشکلات کلیوی و ادراری ممکن است خطرناک باشد. همچنین اگر بیماری پارکینسون یا سابقه افسردگی و اضطراب دارید، حتماً با پزشک مشورت کنید.

مصرف اسپری ایپراتروپیوم بروماید برای کودکان زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود و برای استفاده از اسپری ایپراترکس در بارداری یا شیردهی نیز بهتر است حتماً با پزشک متخصص مشورت کنند.

تداخلات دارویی آتروونت یا ایپراتروپیوم بروماید

- اکلیندینیوم
- سیمتروپیوم
- الوکسادولین
- (گلیکوپیرولات) (استنشاق دهانی)
- (گلیکوپیرونیوم) (موضعی)
- لووسولپرید
- لوکساپین
- اوکساتومید
- پتاسیم کلرید
- پتاسیم سترات
- نیتروگلیسیرین
- تیوتروپیوم

اسپری تنفسی سروفلو چیست و چه کاربردی دارد؟

اسپری تنفسی سروفلو ترکیبی از دو دارو است که راه‌های هوایی را باز کرده و تنفس را آسان می‌کند. این دارو در درمان آسم (خس خس سینه و تنگی نفس) و اختلال انسداد مزمن ریه (اختلال ریوی که در آن جریان هوا به ریه‌ها مسدود می‌شود) استفاده می‌شود. پزشک به شما خواهد گفت که هر چند وقت یکبار باید از اسپری خود استفاده کنید. اثر این دارو ممکن است پس از چند روز محسوس باشد اما تنها پس از چند هفته به حداکثر خود می‌رسد. برای اثربخشی این دارو باید به طور منظم استفاده شود، بنابراین حتی اگر هیچ علامتی ندارید مصرف آن را ادامه دهید. اگر مصرف آن را متوقف کنید، آسم و اختلال انسداد مزمن ریه ممکن است بدتر شوند. نباید برای تسکین حملات ناگهانی آسم استفاده شود.

عوارض اسپری سروفلو

شایع‌ترین عوارض جانبی اسپری تنفسی سروفلو، عبارتند از: تهوع، استفراغ، عفونت دستگاه تنفسی، عفونت‌های قارچی در دهان، سردرد، گرفتگی صدا، گلودرد، سرفه، درد اسکلتی-عضلانی (استخوان، ماهیچه یا مفاصل) و افزایش ضربان قلب. اگر این علائم را مشاهده کردید، مصرف آن را قطع نکنید بلکه با پزشک خود صحبت کنید. شما می‌توانید با شستن دهان و گلو با آب یا مسواک زدن دندان‌های خود پس از استفاده از استنشاق از برخی از این علائم جلوگیری کنید. عوارض جانبی نادر دیگری نیز وجود دارد که می‌تواند جدی باشد. اگر در مورد آنها نگران هستید با پزشک خود صحبت کنید. به طور کلی، شما باید سعی کنید از موقعیت‌هایی که آسم شما را بدتر می‌کند، اجتناب کنید و سعی کنید سیگار نکشید.

نحوه استفاده از اسپری تنفسی سروفلو

قبل از استفاده، برچسب را برای دستورالعمل‌ها بررسی کنید. دستگاه تنفسی را تکان دهید. در حالی که از دهان تنفس می‌کنید، یک بار اسپری را فشار دهید تا دارو آزاد شود و نفس خود را به مدت ۱۰ ثانیه نگه دارید. این کار را تا زمانی تکرار کنید که تعداد پافی که پزشک توصیه کرده، استنشاق کنید. پس از آن، دهان خود را کاملاً با آب بشویید.

داروی استیل سیستین چیست؟

استیل سیستین دارویی است که برای درمان مصرف بیش از حد پاراستامول و شل کردن مخاط غلیظ در افراد مبتلا به اختلالات برونش ریوی مزمن مانند ذات الریه و برونشیت استفاده می‌شود

عوارض قرص جوشان استیل سیستین

مشکل در تنفس یا بلع

تب

کهیر یا خارش

حالت تهوع

بثورات با یا بدون تب

قرمز شدن پوست به خصوص اطراف گوش

استفراغ شدید یا مداوم

تورم چشم‌ها، صورت یا داخل بینی

خستگی یا ضعف غیر معمول

موارد احتیاط و منع مصرف قرص جوشان استیل سیستین

به خصوص در موارد ابتلا به آسم، زخم معده و روده. در دوران بارداری نیز این دارو باید فقط در صورت نیاز مصرف شود

تداخلات دارویی استیل سیستین

- آزیترومايسين
- باز دوکسيفن / استروژن های کونژوگه
- کلرامفنیکل
- کلاریترومايسين
- داکسی سایکلین
- پایه اریترومايسين
- اریترومايسين اتیل سوکسینات
- اریترومايسين لاکتوبیونات
- اریترومايسين استئارات
- مینوسیکلین
- پروبنسید
- پیکوسولفات سدیم / اکسید منیزیم / اسید سیتریک بدون آب
- نتراسایکلین
- وانکومايسين

داروی برم هگزین چیست؟

یک داروی بدون نسخه است که برای درمان اختلالات تنفسی مرتبط با مخاط اضافی یا خلط غلیظ مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دارو به عنوان یک عامل موکولیتیک شناخته می‌شود. عوامل موکولیتیک داروهایی هستند که با تجزیه مخاط، سرفه کردن را راحت‌تر می‌کنند.

عوارض قرص برم هگزین یا شربت آن چیست؟

- تحریک گوش
- بثورات پوستی آلرژیک
- سرگیجه
- سردرد
- حالت تهوع از عوارض برم هگزین در کودکان
- استفراغ
- اسهال
- مشکل در هنگام تنفس
- عرق کردن
- سردرد
- عفونت دستگاه تنفسی
- عفونت گلو

تداخل دارویی قرص برم هگزین با سایر داروها

- آلبوترول..
- اسپرین
- اتورواستاتین
- آگمنتین (آموکسی سیلین/کلاوولانات)
- کلپیدوگرل
- کدئین
- سولفات آهن
- ایبوپروفن
- لاکتولوز
- لازیکس (فروزماید)
- لیبیتور (آتورواستاتین)
- متفورمین
- پانتوپرازول
- پاراستامول (استامینوفن)
- پردنیزولون
- پرگابالین

شربت دکسترومتورفان چیست؟

دکسترومتورفان پی یک داروی سرکوبکننده‌ی سرفه در بیماری‌هایی مثل سرماخوردگی یا سینوزیت است که موجب عفونت راه‌های هوایی می‌شوند. داروی دکسترومتورفان سرکوبکننده‌ی سیگنال‌هایی است که به مغز می‌روند و رفلکس سرفه را تحریک می‌کنند

عوارض دکسترومتورفان

- تشنجهای شدید
- تهوع
- استفراغ
- بی‌قراری
- اضطراب شدید
- گیجی
- توهم
- آهسته شدن حرکات
- آهسته شدن تنفس
- ناراحتی معده
- بی‌بوست
- واکنش آلرژیک با علامت‌های سختی در تنفس، ورم صورت و حلق، راش، خارش

موارد احتیاط مصرف قرص یا شربت دکسترومتورفان

- دکسترومتورفان ممکن است به دلیل ایجاد خواب‌آلودگی باعث کاهش هوشیاری و آگاهی شما شود پس بهتر است در زمان رانندگی از آن استفاده نکنید
- از مصرف همزمان قرص‌های لاغری، قرص‌های کافئین‌دار، داروهای درمانی بیش‌فعالی خودداری کنید. چون ممکن است عارضه‌های جانبی دارو را افزایش دهد
- فرم‌های مایع مصنوعی داروهای سرفه ممکن است حاوی فنیل آلانین باشند و اگر بیماری فنیل کتونوریا دارید این دارو می‌تواند برای شما خطرناک باشد
- از نوشیدن الکل همزمان با مصرف این دارو خودداری کنید، زیرا الکل عوارض جانبی این دارو را افزایش می‌دهد
- در صورتیکه بیماری ریوی مثل آمفیزم یا برونشیت مزمن یا آسم دارید قبل از مصرف این دارو به پزشک اطلاع دهید

تداخلات دارویی دکسترومتورفان با سایر دارو ها

- داروهای درمان‌کننده‌ی فشارخون
- ضدافسردگی‌ها مثل آمی‌تریپتیلین، بوپروپیون، فلوکستین، فلووکسامین، ایمی‌پرامین، سرترالین
- رانولازین
- سلکسیب

داروی آموکسی کلاو چیست؟

کو-آموکسی کلاو مخلوطی از آموکسی‌سیلین، آنتی‌بیوتیک مرتبط با پنی‌سیلین و اسید کلاوولانیک دارویی برای اثر بخشی به بیشتر به آموکسی‌سیلین است. آموکسی کلاو برای درمان عفونت‌های رایجی مانند عفونت‌های قفسه سینه، عفونت‌های سینوسی، عفونت‌های پوستی و عفونت‌های ادراری و غیره استفاده می‌شود

عوارض قرص آموکسی کلاو

- اسهال یا درد شکمی.
- برفک دهان
- احساس تهوع و استفراغ

علامت حساسیت به کو آموکسی کلاو

- لب‌ها، دهان، گلو یا زبان ناگهان متورم می‌شود که از مهمترین علائم حساسیت به آموکسی کلاو است
- به سختی و سریع نفس می‌کشید یا ممکن است احساس خفگی و نفس نفس زدن داشته باشید
- آب دهان خشک شده و به سختی توانایی بلعیدن دارید

منع مصرف و موارد احتیاط کپسول آموکسی کلاو

- افرادی که به پنی‌سیلین یا آنتی‌بیوتیک‌های نوع سفالوسپورین حساسیت دارند
- افرادی که در گذشته هنگام مصرف کوآموکسی کلاو یا سایر آنتی‌بیوتیک‌های پنی‌سیلینی دچار مشکلات کبدی یا زردی شده‌اند
- افرادی که به هر یک از مواد تشکیل‌دهنده دارو حساسیت دارند. برخی از سوسپانسیون‌های کوآموکسی کلاو ممکن است حاوی آسپارتام، منبع فنیل آلانین باشند. بنابراین ممکن است برای افرادی که دارای اختلال ارثی متابولیسم پروتئین به نام فنیل کتونوری هستند، مصرف این دارو مناسب نباشد

تداخلات دارویی کوآموکسی کلاو

- آلپورینول یا پروبنسید که برای درمان نقرس استفاده می‌شود
- وارفارین، دارویی که به جلوگیری از لخته شدن خون کمک می‌کند
- متوترکسات، برای درمان سرطان یا بیماری‌های روماتیسمی استفاده می‌شود
- مایکوفنولات موافیل، برای جلوگیری از پس زدن اندام‌های پیوندی استفاده می‌شود
- انواع واکسن مانند واکسن حبیه، واکسن وبا و واکسن ب.ث.ژ.
- تتراسیکلین‌ها، لاکتوباسیلوس و استریول
- آمینوگلیکوزیدها، سدیم پیکوسولفات

بتاهیستین چیست؟

برای درمان سرگیجه، زنگ زدن در گوش، از دست دادن شنوایی و تهوع در کسانی که بیماری مینیر دارند، استفاده می‌شود. این دارو باعث بهتر شدن جریان در گوش داخلی می‌شود و برای افراد بالای ۱۸ سال کاربرد دارد. بیماری مینیر، یک بیماری پیشرونده در گوش داخلی است که علائمی مثل سرگیجه، از دست دادن شنوایی و وزوز گوش دارد. این علائم به علت قطع شدن یا اختلال در هموستاز مایع آندولنف در گوش داخلی ایجاد می‌شوند.

عوارض جانبی داروی بتاهیستین

- درد معده
- سردرد
- واکنش آلرژیک مثل ورم صورت و لب
- تنگی تنفس
- راش و خارش پوستی
- تهوع
- نفخ
- آریتمی قلبی
- آیا قرص بتاهیستین خواب آور است؟
- بله، قرص آمی بت بتاهیستین می‌تواند باعث خواب آلودگی شود. آنتی هیستامین‌های خواب آور می‌توانند به رفع تهوع خفیف، بیماری یا سرگیجه کمک کنند

موارد هشدار و احتیاط

- در صورتی که سابقه حساسیت به بتاهیستین یا مواد تشکیل دهنده آن را دارید به پزشک اطلاع دهید. اگر به بیماری آسم، فئوکروموسیتوما یا تومورهای آدرنال و راش‌های پوستی مبتلا هستید حتما در سابقه بیماریتان اعلام کنید. بتاهیستین دارای آلفا لاکتوز مونوهیدرات است و کسانی که عدم تحمل گالاکتوز دارند نباید از آن استفاده کنند

تداخلات دارویی قرص اکتوسرک بتاهیستین با داروهای دیگر.

- آنتی هیستامین
- سایمتیدین
- آریپیرازول
- آمفتامین
- آموکسپین
- آزاتادین
- سیتیزین
- کلرپرومازین
- کلوزاپین
- دوبوتامین
- اپی نفرین
- دوکسپین
- فاموتیدین

شربت سیتیزین یا قرص سیتیزین چیست؟

- داروی سیتیزین نوعی آنتی‌هیستامین یا داروی ضد حساسیت است که برای درمان آلرژی شدید و بیماری‌های فصلی استفاده می‌شود. زمانی که میکروب یا آلرژن (ماده حساسیت‌زا) از راه تنفسی یا از راه دهان وارد بدن می‌شوند، سلول‌های دفاعی شروع به ساخت هیستامین می‌کنند که با علائمی مانند آبریزش بینی بروز می‌کند. سیتیزین از طریق کمک به گلبول‌های سفید برای مقابله با میکروب و کاهش ترشح هیستامین در بدن عمل می‌کند

عوارض جانبی سیتیزین برای کودکان و بزرگسالان

- خواب‌آلودگی
- خستگی
- خشکی دهان
- سردرد
- گرفتگی بینی هنگام خواب

موارد احتیاط مصرف سیتیزین

- کپرهایی با رنگ‌های غیرمعمول..
- کپرهایی شبیه به کبودی
- تاول و کپرهایی که خارش ندارند

تداخل دارویی سیتیزین چیست؟

- داروهایی که خواب‌آلودگی ایجاد می‌کنند (مخدرهایی که کاهنده‌ی سرفه یا درد هستند مثل کدئین و هیدروکدون)
- داروهای ضد اضطراب (مانند آلپرازولام، لورازپام و زولپیدم)
- شل‌کننده‌های عضلانی (مانند کاریزوپروپدول و سیکوبنزاپرین)
- سایر آنتی‌هیستامین‌ها (مانند کلرفنیرامین و دیفن‌هیدرامین)
- آنتی‌هیستامین‌هایی که مصرف پوستی دارند، شامل کرم، پماد یا اسپری
- هیدروکسی‌زین و لووستیزین
-

قرص فولیک اسید چیست؟

اسید فولیک یک ویتامین مصنوعی از خانواده ویتامین‌های ب است که به عنوان شکل سنتتیک ویتامین ب_۹ شناخته می‌شود. این ویتامین به طور طبیعی در مواد غذایی مانند سبزیجات برگ‌سبز، مرکبات، حبوبات و غلات یافت می‌شود، اما در مکمل‌های غذایی و غذاهای غنی‌شده نیز به شکل مصنوعی استفاده می‌شود.

عوارض فولیک اسید چیست؟

- حالت تهوع
- نفخ
- بی‌اشتهایی
- مشکلات گوارشی خفیف
- پوشاندن کمبود ویتامین ب_{۱۲}

عوارض قرص آهن و فولیک اسید

- مشکلات گوارشی: یبوست، حالت تهوع، یا دل‌درد (به دلیل آهن)
- مزه فلزی در دهان: مصرف قرص آهن می‌تواند این احساس را ایجاد کند.

تداخلات دارویی اسید فولیک

- داروهای ضدتشنج: مانند فنیتوئین و کاربامازپین، که ممکن است اثربخشی آنها را کاهش دهد.
- داروهای شیمی‌درمانی: مانند متوترکسات، که با فولیک اسید تداخل دارد و نیاز به تنظیم دوز دارد.
- آنتی‌بیوتیک‌ها: برخی آنتی‌بیوتیک‌ها (مانند تری‌متوپریم) می‌توانند اثر فولیک اسید را کاهش دهند.
- داروهای ادرارآور: مانند تریامترن، که ممکن است بر سطح فولات در بدن تأثیر بگذارد.

قرص کارودیلول برای چیست؟

داروی کارودیلول برای درمان فشار خون بالا و نارسایی قلبی به کار می‌رود. این دارو جهت بهبود علائم بقا پس از حمله قلبی نیز به کار می‌رود. کارودیلول با کاهش فشار خون بالا به جلوگیری از حمله قلبی و مشکلات کلیوی کمک زیادی می‌کند. کارودیلول به خانواده بتا بلاکرها تعلق دارد.

عوارض جانبی شایع

- سرگیجه
- عدم تعادل
- خستگی
- بی‌قراری
- خشکی دهان
- تهوع
- سردی دست و پاها
- علائم پوستی
- خارش
- تورم مخصوصا در (صورت، زبان و گلو)
- گیجی شدید
- و اختلال تنفسی را تجربه کردید، سریعا از فوریت های پزشکی کمک بگیرید

موارد احتیاط مصرف کارودیلول چیست؟

- مشکلات ریتمی قلبی مانند ضربان قلب کند
- سندروم سینوس بیمار و تپش قلب درجه ۲ و ۳
- مشکلات تنفسی مانند:
 - آسم
 - برونشیت مزمن
 - امفیزما
- مشکلات گردش خون مثل بیماری ریناود، بیماری عروقی محیطی
- بیماری ماهیچه‌ای میاستنی گراویس
- مشکلات کبدی
- مشکلات کلیوی
- بیماری حاد تیروئیدی هایپرتیروئیدیسم
- نوع خاصی از تومور فنوکروموسیتوم
- مشکلات قلبی مانند آنژین های صدری
- مشکلات چشمی آب مروارید و گلوکوم
- واکنش آلرژیک جدی که نیاز به درمان با اپی نفرین داشته باشد

تداخلات دارویی کارودیلول با داروهای دیگر.

- فینگولیمود
- داروهایی که باعث افزایش ضربان قلب یا فشار خون می‌شوند
- داروهایی که خطر نارسایی قلبی را افزایش می‌دهند
- داروهای ضدسرفه و سرماخوردگی
- داروهای رژیم غذایی

مسکن مانند ایبوپروفن و ناپروکسن

داروی لوتیراستام چیست؟ (لوبل)

داروی لوتیراستام (قرص لوبل، الپرا یا لوسیزر) متعلق به دسته‌ای از داروها است که به عنوان داروهای ضد تشنج شناخته می‌شوند. این دارو همراه با سایر داروها برای درمان انواع خاصی از تشنج در بزرگسالان و کودکان مبتلا به صرع کاربرد دارد و باعث کاهش هیجان غیر طبیعی در مغز می‌شود.

عوارض قرص لوتیراستام

قرص لوسیزر یا لوتیراستام ممکن است باعث تغییر در خلق و خو یا رفتار، مشکلات هماهنگی بدن، خستگی یا ضعف غیر معمول شود. اگر شما یا فرزندتان شروع به احساس افسردگی، اضطراب، عصبانیت، ناراحت شدن شدید، بی‌قراری یا فکر کردن در مورد آسیب رساندن به خود داشتید، سریع به پزشک اطلاع دهید.

موارد احتیاط و هشدار مصرف لوتیراستام

قبل از مصرف لوتیراستام، اگر به آن یا آلرژی دارید، به پزشک یا داروساز بگویید و سابقه‌ی پزشکی خود را خصوصاً در مورد بیماری کلیوی (مانند درمان با دیالیز) و اختلالات روحی مانند افسردگی با دکتر متخصص در میان بگذارید. مصرف لوتیراستام لوبل به خصوص در ماه اول درمان، ممکن است باعث سرگیجه یا خواب‌آلودگی شود. قبل از جراحی، در مورد تمام محصولات مورد استفاده خود (مانند داروهای تجویز شده، داروهای بدون نسخه و محصولات گیاهی) به پزشک یا دندانپزشک اطلاع‌رسانی کنید.

افراد مسن ممکن است نسبت به عوارض جانبی لوتیراستام، به ویژه خواب‌آلودگی، سرگیجه یا از دست دادن هماهنگی حرکات بدن حساسیت نشان دهند. این عوارض جانبی می‌تواند خطر زمین خوردن را افزایش دهد.

تداخلات دارویی لوتیراستام یا لوسیزر

- برم پریدول، اورفنادرین، اوکسومازین
- پارالدهید، تالیدومید
- بریواراستام
- کاربامازپین، فوس فنی‌توئین- فنی‌توئین
- مفلوکین، میانسرین
- بلونانسرین، برکسانولون
- بوپرنورفین
- آلپزاید، بریمونیدین (موضعی)
- برومپرید

قرص نفروویت

این مولتی ویتامین در جهت درمان و پیشگیری از کمبود ویتامین در بیماران کلیوی که دیالیز می‌شوند، تهیه شده است. بیماران کلیوی به دلیل مشکلاتی که در جذب ویتامین‌ها دارند و همچنین از آنجا که برخی از ویتامین‌ها را به هنگام دیالیز دفع می‌کنند، نمی‌توانند از هر مولتی ویتامین معمولی استفاده کنند. متأسفانه مکمل‌های مخصوص برای این گروه بسیار نادر هستند. قرص نفروویت محصول شرکت اسوه دارو به عنوان تنها مولتی ویتامین مخصوص بیماران کلیوی شناخته می‌شود. این قرص به گونه‌ای طراحی شده که متناسب با نیاز بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیوی می‌باشد.

قرص نفروویت برای چیست؟

- بهبود عملکرد سیستم ایمنی و عصبی
- کاهش ضعف و خستگی
- کمک به خون‌سازی
- کمک به کنترل دفع پروتئین در بیماران کلیوی

تامین ویتامین‌ها و مواد معدنی مورد نیاز بیماران

عوارض قرص نفروویت

- اسهال خفیف و گذرا، پلی سیتی، ترومبوز عروق محیطی خارش، احساس تورم در تمام بدن، شوک آنافیلاکسی، آتاکسی عدم تعادلی، سندرم آسیب به اعصاب حسی، احساس گرما و گرگرفتگی، کهیر، ضعف، تعریق، سیانور و ادم ریوی
- یکی از اجزای این فرآورده ممکن است سبب پاراستزی احساس گزگز در انگشتان (مصرف پیریدوکسین دست و پا، خواب آلودگی، تهوع و سردرد شود.
- واکنش‌های آلرژیک با مصرف فرم خوراکی فولیک اسید (از اجزای این فرآورده) ممکن است مشاهده شود.

انالاپریل

انالاپریل متعلق به دسته داروهای کنترل کننده فشار خون است که با دفع بعضی املاح و مایعات از طریق ادرار فشار خون را در

رگ ها کاهش می دهد و بار قلب و کلیه را سبک می کند

ممکن است این دارو جهت کاهش فشار خون بالا ، درمان نارسایی قلبی تجویز شود

تداخل های دارویی :

نوشابه های حاوی الکل، داروهای مدر یا سایر داروهای کاهش دهنده فشار خون - اثرات کاهش دهنده فشار خون ممکن است افزایش یابد

داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی بخصوص ایندومتاسین - مصرف همزمان این داروها با انالاپریل ممکن است اثر ضد فشار خون انالاپریل را کاهش دهد

خون از بانک خون، سیکلوسپورین، مدرهای حاوی پتاسیم، شیر کم نمک، داروهای حاوی پتاسیم، مکمل های پتاسیم یا مواد حاوی غلظت های بالای پتاسیم یا جایگزین های نمک - مصرف همزمان انالاپریل با این داروها ممکن است منجر به هیپرکالمی (افزایش پتاسیم در خون) گردد. مصرف همزمان این داروها در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب توصیه نمی گردد
آلوپورینول، داروهای سیتوتوکسیک، پروکائین آمید، کورتیکواستروئیدهای سیستمیک، داروهای تضعیف مغز استخوان - مصرف همزمان این داروها با انالاپریل ممکن است منجر به افزایش احتمال بروز نوتروپنی (کاهش گلبول سفید) و یا آگرانولوسیتوز گردد

لیتیم - در مصرف همزمان با انالاپریل، افزایش قابل برگشت در میزان لیتیم سرم و سمیت دارو گزارش شده است
داروهای سمپاتومیمتیک - مصرف همزمان ممکن است باعث کاهش اثرات ضد فشار خون این داروها گردد

موارد منع مصرف:

سابقه حساسیت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده این دارو
بیماران با سابقه آنژیوادم مربوط به درمان قبلی با یک داروی مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین
بیماران با آنژیوادم موروثی یا ایدیوپاتیک

درخصوص نحوه صحیح مصرف دارو به این نکات توجه کنید:

این دارو را هر روز دقیقاً مطابق با دستور پزشک، در یک زمان مشخص در طی روز مصرف نمایید. از مصرف مقادیر و دفعات بیشتر از دستور پزشک خودداری کنید

در طی درمان وزن و رژیم غذایی خود خصوصاً مصرف سدیم را کنترل نمایید. از مصرف جایگزین های نمک و یا شیر حاوی مقادیر کم سدیم بدون دستور پزشک خودداری نمایید

در برخی بیماران ممکن است علائم فشار خون بالا دیده نشود. در چنین شرایطی مصرف دارو حتی با احساس بهبودی نیز ادامه یابد

را علاج نمی کند ولی به کنترل آن کمک می نماید و ممکن است مصرف آن برای تمام عمر این دارو **فشار خون بالا** ضروری باشد. بنابراین قبل از قطع مصرف دارو با پزشک خود مشورت کنید. عدم درمان فشار خون بالا با خطرات جدی همراه است

در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن فوراً آن را میل کنید. ولی اگر تقریباً زمان نوبت مصرف بعدی فرا رسیده باشد، نوبت مصرف نشده را فراموش کرده و برنامه عادی خود را از سر بگیرید. از دوبرابر کردن مقدار دارو خودداری کنید

قرص کلسیم برای چیست؟

کلسیم یکی از مواد ضروری برای ادامه حیات است و بسیاری از عملکردهای بدن ما به واسطه آن انجام می‌شود. رژیم غذایی بهترین روش دریافت کلسیم است، اما اگر رژیم غذایی فرد به اندازه کافی کلسیم نداشته باشد باید از مکمل کلسیم استفاده کند.

تداخلات دارویی قرص کلسیم

- قرص آهن
- آنتی‌بیوتیک‌ها
- بتابلاکرها
- کورتیکواستروئیدها
- داروی فشار خون
- داروهای تیروئیدی

عوارض قرص کلسیم چیست؟

- سنگ کلیه: از عوارض این قرص برای کلیه، تشکیل سنگ‌های کلیوی است.
- فشار خون: مصرف زیاد کلسیم باعث افزایش فشار خون می‌شود.
- هایپرکلسمی: در صورت افزایش میزان کلسیم در خون فرد دچار هایپرکلسمی می‌شود که با علائمی چون درد معده، افسردگی و تهوع همراه است.
- سرطان پروستات: افزایش کلسیم خون ریسک ابتلا به سرطان پروستات را افزایش می‌دهد.
- سکته قلبی: افزایش فشار خون ناشی از ازدیاد کلسیم، خطر ابتلا به سکته قلبی را بالا می‌برد.

بهترین زمان مصرف قرص کلسیم چه زمانی است؟

بهتر است مکمل کلسیم را در وعده شام میل کنید.

نکات مهم قبل از مصرف قرص کلسیم

- اگر دچار سوءمصرف مواد و سیگار هستید، بهتر است برای مصرف مکمل کلسیم سیگار را ترک کنید.
- مصرف نمک و سدیم باعث کاهش جذب کلسیم می‌شود، بهتر است در دوره مصرف این قرص سدیم کمتری مصرف کنید.

قرص ویتامین ب ۱ چیست؟

قرص تیامین یا ویتامین ب یک به عنوان مکمل غذایی و زمانی استفاده می‌شود که مقدار تیامین در رژیم غذایی کافی نباشد. نبود ویتامین ب یک در بدن عوارض و خطرات بسیاری برای سلامتی فرد دارد. وجود این ویتامین خستگی بدن را کاهش می‌دهد در افراد مبتلا به بیماری‌هایی از جمله بری بری، التهاب اعصاب (نوریت)، مشکلات گوارشی، درد عصب دیابتی و بیماری قلبی مصرف این دارو ضرورت می‌یابد

عوارض جانبی مصرف ویتامین ب ۱

- خستگی
- خارش بدن
- حالت تهوع
- تورم
- سختی تنفس
- مشکل در بلع
- تحریک پذیری
- تعریق
- افسردگی

موارد احتیاط و منع مصرف قرص ویتامین ب ۱

- برخی از مواردی که نیاز به احتیاط دارد دوران بارداری، شیردهی و مبتلایان به برخی بیماری‌های خاص هستند. این افراد ضمن رعایت نکات گفته شده در ادامه، بهتر است با پزشک متخصص خود در رابطه با مصرف این ویتامین مشورت کنند

تداخلات دارویی قرص ویتامین ب ۱

- به طور کلی مصرف تیامین در زمان مصرف داروهای دیگر بی‌خطر است. با این حال، اگر در حال مصرف فلوئورواوراسیل (دارویی که برای درمان برخی از انواع سرطان استفاده می‌شود) هستید، قبل از شروع مصرف تیامین با یک پزشک مشورت کنید. فلوئورواوراسیل می‌تواند بر نحوه عملکرد تیامین تأثیر بگذارد. ممکن است پزشک نیاز به تنظیم دوز تیامین شما داشته باشد

قرص پردنیزولون چیست؟

قرص پردنیزولون یک داروی کورتیکواستروئیدی (گلوکوکورتیکوئید) است که برای کاهش التهاب و سرکوب سیستم ایمنی بدن و در درمان بیماری‌های مختلفی از جمله آلرژی‌های شدید، آرتریت روماتوئید، آسم، اختلالات پوستی، التهاب چشمی و بیماری‌های خودایمنی مانند لوپوس کاربرد دارد. پردنیزولون با مهار واکنش‌های التهابی بدن، علائم ناشی از این بیماری‌ها را کاهش می‌دهد.

عوارض قرص پردنیزولون

- ضعف سیستم ایمنی و افزایش خطر عفونت‌ها
- افزایش وزن و احتباس آب
- افزایش قند خون و خطر دیابت
- افزایش فشار خون
- زخم معده و مشکلات گوارشی
- پوکی استخوان و افزایش خطر شکستگی
- تغییرات خلقی، اضطراب یا افسردگی

موارد احتیاط و منع مصرف قرص پردنیزولون

قرص پردنیزولون باید در افرادی که دارای بیماری‌های عفونی فعال هستند، با احتیاط مصرف شود، زیرا می‌تواند سیستم ایمنی بدن را ضعیف کرده و خطر عفونت‌ها را افزایش دهد. همچنین، افراد مبتلا به زخم معده یا بیماری‌های گوارشی باید از این دارو با احتیاط استفاده کنند. فشار خون بالا و دیابت از دیگر شرایطی است که در مصرف پردنیزولون باید دقت شود، زیرا این دارو ممکن است فشار خون را افزایش دهد و قند خون را بالا ببرد. مصرف طولانی‌مدت پردنیزولون می‌تواند موجب پوکی استخوان شود.

اختلالات دارویی قرص پردنیزولون

- داروهای ضدانعقاد خون (مانند وارفارین) با تقویت اثرات داروهای ضدانعقاد و افزایش خطر خونریزی
- داروهای ضد دیابت با افزایش افزایش قند خون
- داروهای فشار خون بالا با کاهش اثرات دارو
- داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی با افزایش خطر عوارض گوارشی مانند زخم معده
- داروهای کورتیکواستروئیدی دیگر با تشدید عوارض جانبی

گلی کلایید چیست؟

گلی کلایید یکی از داروهای دیابت است. این دارو برای افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ تجویز می‌شود و برای دیابت نوع ۱ مناسب نیست. قرص گلیکلایید تولید انسولین توسط لوزالمعده را افزایش داده و از این طریق قند خون را کاهش می‌دهد.

عوارض جانبی قرص گلی کلایید چیست؟

- معده درد یا سوءهاضمه
- حالت تهوع
- استفراغ
- اسهال
- بی‌خوابی

تداخلات دارویی گلی کلایید

- میکونازول
- فنیل بوتازون
- قرص‌های استروئیدی مانند پردنیزولون
- برخی داروهای درمان مشکلات قلبی و فشارخون بالا
- داروهای درمان عفونت باکتریایی یا قارچی مانند فلوکونازول و کلاریترومایسین
- داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن و آسپرین
- داروهای درمان آسم مانند سالبوتامول

منع مصرف داروی گلی کلایید

- حساسیت به داروهای دسته سولفونیل اوره و سولفونامید
- دیابت نوع ۱
- سابقه کمای دیابتی، پیش‌کما و کتواسیدوز دیابتی
- عفونت شدید، ضربه یا جراحی
- نارسایی شدید کلیوی و کبدی (در این شرایط مصرف انسولین توصیه می‌شود)

لووتیروکسین چیست

از داروی لووتیروکسین برای درمان تیروئید کمکار استفاده می‌شود. کمکاری تیروئید در مواقعی رخ می‌دهد که غده تیروئید به طور معمول هورمون کمتری ترشح کند

همچنین از داروی لووتیروکسین برای درمان سایر اختلالات تیروئید از قبیل بعضی از انواع گواتر و سرطان تیروئید تجویز می‌شود

عوارض جانبی مصرف لووتیروکسین

- تعرق شدید
- حساسیت به گرما
- تغییرات روحی و روانی مانند اضطراب و نوسانات خلقی
- خستگی
- اسهال
- لرزش
- سردرد
- تنگی نفس
- استخوان درد
- شکستگی آسان استخوان‌ها
- درد قفسه‌ی سینه
- تپش سریع، شدید و نامنظم قلب
- تورم دست‌ها، مچ پا و پاها
- تشنج

تداخلات دارویی لووتیروکسین با داروهای دیگر

رقیق کننده‌های خون مانند وارفارین، دیگوکسین و ساکروفریک اوکسی هیدروکساید ممکن است با داروی لووتیروکسین تداخل ایجاد کنند

نیتروکانتین (نیتروگلیسرین)

نیتروگلیسرین متعلق به گروهی از داروها به نام نیترات است که برای جلوگیری از آنژین (درد قفسه سینه) ناشی از بیماری عروق کرونر تجویز می‌شود. این دارو همچنین برای تسکین آنژین قلبی که در حال حاضر رخ داده است، استفاده می‌شود. نیتروگلیسرین با شل کردن رگ‌های خونی و افزایش انتقال خون و اکسیژن به قلب و در عین حال کاهش بار کاری آن عمل می‌کند. این دارو هنگامی که به طور منظم، به صورت طولانی مدت یا درست قبل از ورزش یا یک رویداد استرس‌زا استفاده می‌شود، از بروز آنژین قلبی جلوگیری می‌کند.

عوارض جانبی نیتروگلیسرین

- سر درد های نوسانی که هر از چند دقیقه درد دارد و دوباره آرام می‌شود و دوباره درد دارد و دوباره
- سرگیجه
- سبکی سر
- حالت تهوع
- گر گرفتگی

تداخلات دارویی نیتروگلیسرین

برومپریدول، مشتقات ارگوت، مهارکننده‌های فسفودی استراز ۵، ریوسیگوات

آلتیلاز، هپارین

داروهای آنتی کولینرژیک، مشتقات ارگوت

داروهای ضد سایکوز (آنتیپیکال [نسل دوم])، برومپریدول، دولوکستین، مشتقات ارگوت، داروهای کاهنده فشارخون، فرآورده‌های حاوی لوودوپا، بی‌حس کننده‌های موضعی

اتانول، باربیتورات ها، داروهای کاهنده فشارخون، بریمونیدین (موضعی)، داپوکستین، داپسون (موضعی)، گیاهان (با خاصیت کاهنده فشارخون)، نیکوراندیل، پنتوکسی فیلین

موارد احتیاط

- در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: کم خونی شدید، خونریزی مغزی، ضربه اخیر به سر، گلوکوم، پرکاری تیروئید، سابقه انفارکتوس اخیر قلبی، کاهش حجم خون و فشار پایین در مویرگ‌های ریوی
- به با مصرف طولانی مدت نیترات‌ها، ممکن است نسبت به اثر آنها تحمل شود و در نتیجه، نیاز بیمار به دارو افزایش یابد. منظور اطمینان از حفظ اثر مطلوب دارو، پیگیری دقیق وضع بیمار توصیه می‌شود
- در صورت لزوم قطع مصرف دارو با توجه به مصرف مقادیر زیاد یا طولانی مدت، به منظور جلوگیری از بروز حمله آنژین ناشی از قطع مصرف دارو، مقدار مصرف باید به تدریج کاهش داده شود
- در صورت بروز تاری دید یا خشکی دهان یا تشدید آن، مصرف دارو باید قطع شود

قرص والسارتان چیست؟

یک داروی مهم برای کنترل فشار خون بالا و درمان نارسایی قلبی است. این دارو با گشاد کردن رگ‌های خونی، باعث کاهش فشار روی قلب می‌شود و به بهبود عملکرد آن کمک می‌کند. البته قرص والسارتان کاربردهای دیگری هم به جز درمان فشار خون دارد

عوارض قرص والسارتان

- سرگیجه
- خستگی
- افت فشار خون
- مشکلات کلیوی
- افزایش پتاسیم خون (هیپرکالمی)
- واکنش‌های آلرژیک (نادر)
- تداخلات دارویی قرص والسارتان با داروهای دیگر
 - دیورتیک‌ها (ادرارآورها)
 - داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی مانند ایبوپروفن و ناپروکسن
 - مکمل‌های پتاسیم یا داروهایی که پتاسیم خون را افزایش می‌دهند
 - داروهای دیگر برای کاهش فشار خون (که می‌تواند منجر به افت شدید فشار خون شود)
 - آلیسکرن و لیتنیوم
 - قرص‌های ضد بارداری که حاوی دروسپیرنون هستند

در این شرایط والسارتان نخورید

- باردار هستید یا در دوره شیردهی قرار دارید
- مشکلات جدی کلیوی یا کبدی دارید
- سطح پتاسیم خون شما به طور غیرطبیعی بالاست

مونته لوکاست یا ایروکاست چیست؟

مونته لوکاست که نوع ایرانی آن ایروکاست نامیده می‌شود، نام دارویی است که برای کنترل و جلوگیری از علائم ناشی از آسم مانند خس‌خس سینه و تنگی نفس و مشکلات تنفسی هنگام ورزش (برونکواسپاسم) تجویز می‌شود

عوارض قرص مونته لوکاست

- بدن درد
- سرفه
- مشکلات تنفسی
- خشکی یا درد گلو
- تب شدید از عوارض قرص مونته لوکاست
- سردرد
- از دست دادن صدا
- درد یا حساسیت در اطراف چشم و استخوان گونه
- درد، قرمزی یا تورم در گوش
- دل درد
- گرفتگی یا آبریزش بینی
- حساس و متورم شدن غدد گردن
- مشکل در بلع
- خستگی یا ضعف غیرمعمول
- تغییر صدا
- خون دماغ شدن
- احساس کسالت عمومی
- درد مفاصل
- تعریق
- وجود چرک در ادرار
- تحریک‌پذیری و اضطراب

- تمایل به خودکشی
- سردرگمی در مورد هویت، مکان و زمان
- بیوست
- تپش قلب یا نامنظم شدن ضربان قلب
- قرمزی پوست، کهیر یا جوش
- سوءهاضمه
- خارش، پف یا تورم پلک‌ها یا اطراف چشم، صورت، لب‌ها یا زبان
- بی‌اشتهایی
- یابددرد در معده، پهلو یا شکم که احتمالاً به سمت پشت ادامه‌می‌ی
- لرزش دست‌ها یا پاها
- مشکل در تمرکز
- مشکلات خواب
- بوی نامطبوع تنفس
- استفراغ خونی
- زردی چشم یا پوست
- داروی مونتئ لوکاست با کدام داروها تداخل دارد؟
 - داسابویر
 - فلوونومید
 - تری فلوونومید پیکسانترون
 - داروی فنازوپریدین
 - جم فیروزیل
 - پردنیزولون

قرص اسپرونولاکتون چیست؟

قرص اسپرونولاکتون یکی از قرص‌هایی است که برای درمان بیماری‌هایی مانند فشار خون، پرمویی، اختلالات پتاسیم و موارد دیگر کاربرد دارد

عوارض قرص اسپرونولاکتون چیست؟

- اسهال و درد های شکمی
- حالت تهوع و استفراغ
- افزایش سطح پتاسیم خون
- گرفتگی ماهیچه‌ها مخصوصاً در پاها
- سردرد، سرگیجه، خواب‌آلودگی
- خارش
- به‌هم‌خوردن سیکل‌های قاعدگی یا خونریزی بعد از یائسگی در خانم‌ها
- کاهش میل جنسی
- متورم و دردناک شدن سینه‌ها

تداخلات دارویی

داروهای مهارکننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین. مانند انالاپریل، کاپتوپریل

داروهای مهار کننده گیرنده آنژیوتانسین مانند والزارتان، لوزارتان

- هپارین
- مکمل‌های پتاسیمی
- سایر ادرارآورهای بازجذب‌کننده پتاسیم مانند، تریامترن، ایلرنون

داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند دیکلوفناک، ایبوپروفن، ناپروکسن

منابع اطلاعات : کتاب داروهای ژنریک ایران (انتشارات خسروی)